

救急選方目錄

上卷

諸卒死門	一
中惡門	五
五絕死門	七
卒中風門	二二
脫陽門	一七
諸厥門	一八
癰癰門	二三
中寒凍死門	二六
中暑暈死門	二七
霍亂門	三〇
攪腸沙門	三三
脚氣衝心門	三五
諸卒失血門	三八
卒心腹痛門	四一

附積氣 鬱胃
卒疝 奔豚

目錄

下卷

急喉痺門	四三
小便急閉門	四四
卒暴雜證門	四七

附轉筋 牙關緊急
舌卒腫 目睛突出

落頭頰 卒變卒瘕 暴盲	四七
諸毒內攻 傷寒併熱霍亂	四七
婦人急證門	五〇
小兒急證門	五六
疔瘡急證門	六三
金瘡癰撲門	六五
破傷風門	六八
湯火傷門	六九
諸咬傷門	七二
諸物入耳門	八五
誤吞諸物門	八八
諸物哽噎門	九一

附兒頭入臼
指入竹筒

一

救急選方

諸物入肉門·····九三

中藥毒門·····九五

二

中飲食毒門·····一〇四

救急選方上卷

丹波元簡廉夫編

諸卒死門

三物備急丸金匱主心腹卒暴百病。若中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刺，氣急口噤，停尸卒死。

大黃一兩

乾薑一兩

巴豆一兩，去皮心，熱外研如脂

右藥各須精新，先搗大黃乾薑爲末，研巴豆內中，合治一千杵，用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之，莫令洩氣。主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刺，氣急口噤，停尸卒死者，以煖水若酒服大豆許三四丸，或不下，捧頭起灌，令下咽，須臾當差。如未差，更與三丸。當腹中鳴，卽吐下便差。若口噤，亦須折齒灌之。案古今錄驗：司空三物備急散，療卒死及盛忤，口噤不開者，卽本方爲散。

還魂湯金匱救卒死客忤死。

麻黃三兩

杏仁七十箇

甘草一兩

右三味，以水八升，煮取三升，去滓，分令咽之，通療諸感忤。裏實者，用備急丸。表實者，用還魂湯。金匱

救卒死方

金

雄雞冠割取血管吹內鼻中。

薤搗汁灌鼻中。

又方

肘

半夏末如大豆許吹鼻中。

案此千金療五絕法。心下溫者。一日亦可治。

又方

同

灸臍中百壯。又方。令人癢爪其人人中取醒。

又方。以細繩圍

其人肘腕中。男左女右。伸繩從背脊上大椎度以下行脊上。灸繩頭。

一云五十壯。

又從此灸橫行各半繩。此凡三灸。各灸三壯。即起。

又方。灸鼻下人中

三壯。

又方。並兩足大指爪甲聚毛中七壯。此華陀法。一云三七壯。

又方

按方集驗

燒炭火一杓。以醋燒之。令患人鼻受醋氣。即甦。

救卒死而壯熱者。

金

礬石半斤。以水一升半煮消。以漬脚。令沒踝。

救卒死而張目反折方。

金

灸手足兩爪後各十四壯了。飲以五毒諸膏散。

有巴豆者。

救卒死而四肢不收失便者方。

金

馬屎一升。水三斗。煮取二斗洗之。又以

牛洞一升。溫酒灌口中。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯。差

小兒卒死。

本草附方

無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通。或嚏即活。

卒死。或先有病痛。或居常倒仆。奄忽而絕。皆是中惡之類。

肘

取葱中央心

刺鼻。令入七八寸。無苦。使目中血出。乃佳。一云耳中血出佳。又方。令

二人以衣壅口。吹其兩耳。極則易人。亦可以葦筒吹之。並捧其肩上。側

身遠之。莫臨死人上。又方。以葱刺耳。耳中鼻中血出者。勿怪。無血難

療之有血者是活候也。又方視其上唇裏弦有青息肉如黍米大以

針決去之差。又方以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中並持其手

足莫令驚動也。又方取皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣。又

方灸其臂下宛宛中名承漿十壯大良。

備急療卒死而口噤不開者。外縛兩手大拇指灸兩白肉中二十壯。

集驗療卒死而有脈形候陰氣先盡陽氣後竭故也。外方嚼薤脯灌之。

驚怖卒死。本草附方溫酒灌之即醒。

療火盜兵戈驚氣入心不能言語者。危證簡便蜜陀僧末一錢清茶調下驚則

氣亂陀僧之重以去怯而平肝也。

小兒驚死。醫法指南用生慈姑汁和白蜜灌之。

偶見人斬血籍籍驚愕卒死者。本朝經驗溫酒灌之嚼醋亦可。

療火燒悶絕不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤絞開與之。千金

療因回祿煙薰致死者。古今醫鑑生蘿蔔搗汁頻咽并嚼塗火瘡。

附免烟薰死法。醫林集要居民逃避石室中賊以煙火薰之欲死迷悶中摸

索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦。又炭煙熏人往往致死含蘿蔔一片

著口中煙氣不能毒人或預曝乾爲末備用亦可。或新水搗爛乾蘿

蔔飲之亦可。

又法 李樓怪症方 一口呵地即不死

退烟散 本朝經方 預服免烟薰死。蒿雀數個。去腸實砂末。浸蘿菔自

然汁一宿。取出。內瓦器中。鹽泥固濟煨存性。研末。每服五七分。白湯

及冷水下。 又療產後血暈。止吐血衄血。 又法。葡萄多食免死。 成膏爲備。尤良。

療笑死 壽域神方 凡口有微氣。心下溫者。用食鹽成塊者二兩。火燒令通赤。候

冷研細。以河水一大碗。同煮至三五沸。放溫分三次服之。後以鵝翎探

於喉中。吐去熱痰三五升。後服黃連解毒湯三二服。則笑自定。人可活

矣。 案張子和。療一婦人喜笑不休半年。用此法。醫統云。黃連解毒湯。加牛夏竹瀝薑汁。療喜笑不休。極效。 喜笑欲死者。鍼列缺二

穴。在手大指後。臂上三寸。及大陵二穴。在掌後橫紋中。鍼三分。立効。

療入井塚悶冒方 壽外 取其水。灑人面。令飲之。又以灌其頭及身體。即活。若

無水。取他水用也。

又方 壽世保元 以水噴其面。并含水。調雄黃末一二錢。入水噴之。

又方 本朝經驗 急解患人衣。偃臥濕地上。以醋噴其面。蓋以草薦。半時許即甦。

救暈鍼法 鍼灸聚英 假令鍼肝經氣暈。以補肝經。鍼入復甦。甘草一二錢水

煎灌下。 本朝經驗

又方 玉機微義 暈鍼者。奪命穴救之。男左女右。取之不回。却再取右。女亦然。此

穴正在手膊上側筋骨陷中。蝦蟆兒上。自肩至肘。正在當中。 醫事綱目云。在曲肘上一尺。

針入三分。

鍼暈者。神氣虛也。不可起鍼。以鍼補之。急用袖掩病人。口鼻回氣。內與熱湯飲之。卽甦。良久再鍼。甚者鍼手膊上側陷中。卽蝦蟆肉上。惺惺穴。或三里。卽甦。若起鍼壞人。入

入浴暈倒。

本朝經論

以冷水噴面。及燒周身。苦酒一鍾。灌口鼻中。或醒後。嘔者。

蘇子降氣湯。調辰砂末飲之。

苓朮湯。

三因

治暑濕鬱發。或入浴暈倒。口眼喎邪。手足轉曳。皆濕溫類也。

附子

茯苓

白朮

乾薑

澤瀉

桂心

右等分。水煎服。

凡人暴死。多是疔毒。急取燈籠照其身。若是小瘡。卽是其毒。宜急用萬靈

奪命丹之類。

湯書大全。方出疔毒門。

中惡門

朱犀散。

得効

治中惡。中忤鬼氣。其證暮夜或登廁。或出郊野。或遊空冷屋室。

或人所不至之地。忽然眼見鬼物。鼻口吸着惡氣。驚然倒地。四肢厥冷。兩手握拳。鼻口出清血。性命遼巡。須臾不救。此證與尸厥同。但腹不鳴。心脇俱煖。凡切勿移動其屍。卽令親戚圍繞。燒麝香安息香樟木之類。直候醒知事。方可移歸。

犀角末五錢

麝香

硃砂各二錢半

右爲末。每服二錢。井水調下。如無前藥。用雄黃末。服一錢。煎桃枝湯調灌。

走馬湯

金匱附方

療中惡心痛腹脹大便不通。

杏仁二枚

巴豆二枚

右二味。以綿纏。搥令碎。熱湯二合。捻取白汁。飲之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊。

又方

外臺

仰臥。以物塞兩耳。以兩個竹筒。內死人鼻中。使兩人痛吹之。塞口。傍無令氣得出。半日所死人。噫噫。勿復吹也。

又方

肘後

灸兩足大拇指上甲後聚毛中。各灸二七壯。即愈。又方。灸右肩

高骨上。隨年壯良。

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。皆不知人。卽是卒厥客忤。飛尸鬼擊。吊死問喪。入廟登塚。多有此病。蘇合香圓灌之。方見中風候稍甦。服調

氣平胃散。要訣

白豆蔻

丁香

檀香

木香各二兩

藿香

甘草各八兩

砂仁四兩

蒼朮八兩

厚朴

陳皮各二兩

右姜棗水煎入鹽十捻。

五絕死門

療五絕死方。千金夫五絕者。一曰自縊。二曰墻壁壓走。三曰溺水。四曰驚寒。

五曰產乳絕。皆取半夏一兩。細下篩。吹一大豆許。內鼻中。即活。心下溫

者。一日亦可活。案夷堅續志。添無病卒死。為六絕死。亦主此方。又醫說。載劉大丞相陵

夏細末一大豆許。細鼻中良久身微暖。氣更醒。人間卒死大丞相方半夏。如何得

救自縊死法。千金旦至暮。雖已冷。必可療。甚至旦。小難也。恐此當言陰氣盛

故也。然夏時夜短於晝。又熱猶應可療。又云。心下若微溫者。一日以上

猶可活。醫學心悟曰。予嘗見自縊至旦。徐徐抱解。不得菴繩。上下安被臥之一

人以脚踏其兩肩。手少挽其髮。常弦弦勿縱之。一人以手按揉胸上數

動之。一人摩捫臂脛屈伸之。若已僵。但漸漸強屈之。并按其腹。如此一

炊頃。氣從口出。呼吸眼開。而猶引按莫置。亦勿苦勞之。須令可少桂湯

及粥清含與之。令嚙喉。漸漸能嚙。乃稍止。兼令兩人以兩管吹其兩耳

彌好。千金云。以新餅覆口。此法最善。無不活也。

又方。千金皂莢末。葱葉吹其兩鼻孔中。逆出復內之。又方。以藍青汁灌之

又極須安定身心。徐徐緩解。慎勿割繩。抱取心下猶溫者。刺雞冠血滴

口中。即活。男用雌雞。女用雄雞。又方。雞屎白。以棗許酒半盞和。灌口

鼻中卽活。又方。梁上塵如大豆各內一筒中。四人各一筒。同時吹兩耳鼻中。極力吹之。

又方

類集

凡自縊之人。若繩細痕深者。最稱難救。須急令人抱。將結解開。

切勿割斷繩子。以手揉其項痕。撚圓氣管。并摩按胸腹。或用手捫其口鼻。或用口對口接氣。令一人以脚踏其兩肩。手挽其髮。常令扯急。不可使頭低下。再令一人以膝蓋或手厚裹衣服。緊緊抵住穀道。婦人并抵陰戶。勿令泄氣。若手脚已經僵直。必須盤曲。如僧打坐之狀。急以兩管吹其兩耳。再碾生半夏末皂角末。吹入鼻孔。以針尖刺鼻下人中穴。以艾灸腳心湧泉穴。男左女右。各三醺。男刺雌鷄冠血。女刺雄鷄冠血。滴入口中。以安心神。再以薑湯化蘇合丸灌之。如無蘇合丸。以濃薑湯灌之。其一切治法。必待氣從口出。呼吸眼開。方可歇手。甦醒後。只宜少飲粥湯。潤其咽喉。不可驟與飯食。依此拯救。再無不活之理。

蘇合丸云。必須心口向溫。大便未下。舌未伸出者救治。

又方

管氏五絕治法

徐徐放下。將喉氣管捻圓。揪髮向上揉擦。用口對口接氣。糞門

用火筒吹之。以半夏皂角搐鼻。以薑汁調蘇合香丸灌之。或煎木香細辛湯調灌亦得。如甦可治。繩小痕深過時身冷者。不治。

用救法活。却用降氣湯三和湯蘇合香丸灌之。

居家必用

救壓死法^三以死人安著將手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開仍與熱小便若初覺氣絕而不能言可急劈口開以熱小便灌之打撲者亦用此

療壓死及墜跌死心頭溫者

奇效方

急扶起將手提其髮用半夏末吹入鼻

內少匙以薑汁同香油打勻灌之次取藥服

又方

其全續方

以雄雞一隻刺血以好酒一碗攪勻熱飲外用連根葱炒爛傳

上包裹之冷再換

治驚與癲癇門互考

救溺死法

金匱

取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔即活

李時珍云用竈灰一石

埋之從頭至足灌七孔良久即甦凡遍溺水死試以灰埋之少頃即便活甚驗蓋灰性暖而能拔水也

又方

附後

取甕傾之以死者伏甕上令口臨甕口以蘆火二七把燒甕中當

死人心下令煙出少入死者鼻口中鼻口中水出盡則活蘆盡更益爲

之取活而止常以手候死人身及甕勿令甚熱冬天常令火氣能使死

人心下足得煖若卒無甕可就岸穿地令如甕燒之令煖乃以死人著

上亦可又方便脫取煖釜覆之取溺人伏上腹中出水便活也

又方

金匱

屈兩脚著生人兩肩上死人背向生人背即負持走行吐出水便

活又方解死人衣灸臍中凡落水經一宿猶可活又方綿裹皂笊

內下部中須臾出水又裹石灰內下部中水出盡則活

又方

得効

用酒壘一箇。以紙錢一把。燒放壘中。急以壘口覆溺水人口面上。

或臍上冷。則再燒紙錢於壘內。覆口面臍上去水。即活。奈人不諳曉。多

以爲氣絕。而不與救療。可憐。

又方

奇効
單方

將醋半盞。灌鼻中。

案本朝經驗。用熱醋一盞。奇効。

凡遇溺水者。視其心坎尚溫。以圓器覆地下。置門一扇於上。令溺者仰臥。

以鴨血灌之口中。或大小便出水。即甦。

廣筆
記

凡人溺水。往往壁泥覆。或倒提出水。皆未全驗。惟用鹽。不拘多少。使強

有力者。自頂及踵。四肢腹背用力摩擦。須臾水自百毛孔中出。良久。腹

消氣甦。雖過時可活。

博覽
類纂

又方

本朝典
藥案方

雄雞冠血。將一茶鍾。灌之。少頃水出。即活。神驗。

凡水溺之人。夏月可救。冬天難救。撈起時。切勿倒控。急急將口撬開。橫啣

筋一雙。使可出水。以竹管吹其兩耳。穢生半夏末。吹其鼻孔。皂角末置

管中。吹其穀道。如係夏月。用牛一隻。將溺人肚皮橫覆牛背之上。兩邊

使人扶住。牽牛緩緩行走。腹中之水。自然從口中并大小便流出。再用

蘇合丸。化開灌之。或生薑汁灌之。若無牛。以活人仰臥。令溺人如前將

肚皮橫覆於活人身上。令活人微微動搖。水亦可出。若一時無牛。兼活

人不肯拯救。或覆鍋一口。將溺人覆於鍋上。亦可。如係冬月。急將濕衣

解去。一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。肚下墊以縣枕一個。仍以灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰墜於眼內。其口脚筋。灌蘇合丸。生薑湯吹耳。鼻穀道等事。俱照夏天救法。冬天醒後。宜少飲溫酒。夏天醒後。宜少飲粥湯。顧體集

溺水死。若五孔有血者。不活。五絕療法

救魔死法。肘後臥忽不寤。勿以火照之。殺人。但痛齧其脚踵。及足拇指甲際。

而多唾其面。則覺也。又方。皂莢末。以竹筒吹兩鼻孔中。即起。又方。

以蘆管吹兩耳。

又方。外臺以鹽湯飲之。多少任意。又方。雄黃細篩。管吹兩鼻中。

又方。千金灸兩足大指聚毛中。二十一壯。

救魔死。不得着燈火照。亦不得近前急喚。多殺人。若原有燈。即存。得効○醫心悟云。

臥處原有燈。則存。如無燈。切不可。可以燈照其面。只可遠遠點燈耳。

雄朱散。得効治魔死。其證初到客舍。或館驛。及久無人居冷房中。睡覺鬼物。

魘魅。或聞其人吃吃作聲。便令人叫喚。如叫不醒者。此乃鬼魘。須臾不。

救即死。

牛黃 雄黃各一錢 硃砂半錢

右爲末和勻。先挑一錢許燒。次挑一錢用酒調灌之。

斃絕者。神虛氣濁。風痰客于心肺。所以得夢不覺。濁氣閉塞而死。氣動不甦。面青黑者不活。急以搐鼻散。引出膈痰。次以蘇合丸。導動清氣。身動則甦。若身靜色陷者不療。五絕療法

搐鼻通天散

猪牙皂角去皮弦一兩

細辛

半夏各五錢

共爲極細末。每用一二分。吹鼻中。得嚏則甦。

救產乳絕法救法。出下婦人急證門。

卒中風門

療卒中法直指

天南星

木香

蒼朮

半夏

細辛

甘草

石菖蒲各一錢

生薑七厚片。水煎。乘熱調蘇合香圓三圓灌下。痰盛者加全蝎二枚炙。療一切卒中初作皆可用此。先以皂角去弦皮。細辛或生南星半夏爲末。搗以管子吹入鼻中。候其噴嚏。卽進前藥。牙噤者中指點南星細辛末并烏梅肉頻擦自開。又方

木香二錢

南星七片

生薑七片

石菖蒲二寸

右水煎乘熱調木香末一錢。蘇合香圓三圓與之。

三生飲易療卒中昏不知人。口眼喎斜。半身不遂。咽喉作聲。痰氣上壅。或

大脈沈伏。或指下浮盛。並宜服之。兼療痰厥飲厥。

南星一兩

川烏半兩

生附半兩

木香一分

右薑十片。水煎。或口噤不省人事者。用細辛。皂角。各少許。或只用半夏。爲末。以蘆管吹入鼻中。候噴嚏。其人少蘇。然後進藥。痰涎壅盛者。每服加全蝎五枚。仍服養生丹鎖鑰之。一法。氣盛人。止用南星八錢。木香一錢。加生薑十四片。煎兩服。名星香散。

生薑生附湯三因療卒中風。涎潮。昏塞不知人。

大附子一枚

右生薑一兩。水煎。冷服。一法。加沈香一錢。一法。加辰砂末少許。此

藥能正氣。消痰散風。神效。

療中風。忽然昏若醉。形體昏悶。四肢不收。風涎潮於上。鬲氣閉不通。宜用救急稀涎散。本

猪牙皂角

四挺。應實不蛀者。去皮。

白礬一兩

右細末。研勻。輕者半錢。重者三字。溫水調灌下。不大嘔吐。但微微冷涎。出一二升。使得醒。醒後緩緩調理。不可便大段。亦恐過傷人。

諸中卒倒。身體強直。口噤不語。脈沈或伏。應用蘇合香丸灌之。一時無藥。

用皂莢末搐鼻。或瓜蒂爲末。水調服吐之。又方。用香油。或生薑自然汁灌之。卽甦。萬全備急方

中風口開。喘急如鼾。撒手遺尿。汗出不止。陽虛暴絕死證也。當以大劑人參附子救之。萬全備急方 又方。當急灸百會人中氣海。危證簡便方

中風痰涎湧盛。昏不知人。應用四生散。南星附子烏頭人參 若熱者。以膽南星三錢。木香一錢。水煎灌之。萬全備急方

凡中風昏倒。最要分別閉與脫。二證明白。如牙關緊閉。兩手握固。卽是閉證。用蘇合香丸。或三生飲之類開之。若口開心絕。手撒脾絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。聲如鼾肺絕。卽是脫證。更有吐沫直視。肉脫髮直。搖頭上擡。面赤如粧。汗出如珠。皆脫絕之證。以人參二熟附煎濃灌下。及灸臍下。雖曰不理。亦可救十中之一。若誤服蘇合香丸之類。卽不可救矣。宗

必讀

口噤。用甘草二段。每段長一寸。炭火上塗麻油炙乾。扶開牙關。令咬定。約人行十里許。又換甘草一段。然後灌藥。極效。醫宗必讀

療初中風筋急口噤。牙關不開。不能進藥者。烏梅肉頻擦牙。牙關酸軟。則易開矣。危證簡便方 又方。天南星爲末。中指蘸擦左右大牙。各二三十指。其

口自開。一方。加片腦等分。一方。加烏梅肉細辛。揉和擦之。

又方。白礬鹽梅等分擦之。涎出自開。

療中風中暑中氣中惡中毒乾霍亂一切卒暴之疾。心法附錄

生薑汁與童

便各半和勻徐徐灌之立可解散蓋薑能開痰下氣童便降火故也

卒暴僵仆不省人事牙關緊急喉中痰聲須設法將藥灌下或人啣藥汁

於銅管中努力吹衝入咽嗑而下妙也服下不宜衆人亂嚷益加恍惚

將患人兩掌摩之及揉二中指并搯鼻下人中。會元

沈香半夏湯治痰涎主氣去痰

附子炮一

沈香分

人參兩半

半夏錢二

南星錢一

右生薑十片水煎

延年療膈上風熱心藏恍惚加醉。外臺

竹瀝三升

鈴羊角屑分二

石膏分十

茯苓分六

右水煎合竹瀝服

獨參湯加竹瀝薑汁療氣虛有痰。金匱

奪命散青蘘療卒暴中風痰涎壅塞牙關緊急目上視等危證大有神效

青礞石四兩。煅

研爲末每服半錢酒調下功效不可盡述。案幼幼新書用此散療痰涎壅塞喉中命在須臾服此散下

風痰乃癰驚利痰之聖藥也。煅消用一兩。

蘇合香圓局方療卒中昏不知人及霍亂不透心腹脹痛鬼注客忤癰癰驚

怖。狐狸等病。或癰撲傷損。氣暈欲絕。凡是倉卒之患。悉皆療之。

香附子

青木香

烏犀角

白朮

朱砂研水

丁香

訶梨勒皮 煨取

白檀香

安息香

別末。無灰酒一升熬膏。

沈香

麝香

萆撥各二兩

龍腦研

薰陸香研

蘇合香油入安息香膏內各一兩

右爲細末。入研藥勻。用安息香膏。并煉白蜜和劑。每服旋丸如梧桐子大。早朝取井華水。溫冷任意化服四丸。老人小兒。可服一丸。溫酒化服亦得。

養正丹方 療元氣虛虧。陰邪交蕩。正氣乖常。上盛下虛。氣不升降。呼吸不

旋。足頭氣短。及中風涎潮。不省人事。陽氣欲脫。

水銀

硫黃研

朱砂研

黑錫去雜碎與水銀結沙各一兩

右用黑蠟一隻。火上鎔黑鉛成汁。次下水銀。以柳杖子攪勻。次下朱砂。攪令不見星子。放下少時。方入硫黃末。急攪成汁和勻。如有焰以醋洒之。候冷取出。研如粉極細。用糯米粉煮糊爲圓。如菉豆大。每服二十粒。加至三十粒。鹽湯下。此藥升降陰陽。既濟心腎。空心食前。棗湯送下。神効不可具述。

暴中卒厥。卒然仆倒昏曠。痰涎壅盛。潮作。若或口開手撒。聲嘶遺尿。眼合。此是臟絕。不理。若不全見。猶可。其有搖頭攢目。面紅髮直。吐沫

汗珠面黑遺尿眼閉口開喘多與夫吐出紫紅此爲不理之病。諸經生書
卒中風不語者用黃雌鷄一隻生破其腹緊縛在臍上即醒能言亦神方
也。是法明人屢書以偶得之附比。

脫陽門

大固陽湯。得効療脫陽證或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不醒人事或傷寒新瘥誤行房小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽證須臾不救。

大附子一兩

白朮

乾薑各半兩

木香一分

右水煎放冷灌服。又方桂枝二兩好酒二升煎至一升候溫分作二服灌之。又葱白連鬚三七莖細剉砂盆內研細用酒五升煮至二升分作三服灌之陽氣即回生薑三七片切碎研酒煎服亦效仍炒葱白或鹽熨臍下氣海勿令氣冷。

久曠之人或縱慾之人與女交合泄而不止謂之走陽其女須抱定勿使陰莖出戶急呵熱氣于口中以指捻尾間即救矣若女人驚而脫去者十有九死亟以童女接氣灌以大劑獨參湯亦可活者。醫宗必讀○丹臺玉案此證亦名脫陽。用大

固陽湯及
其法。

色厥暴脫者必以其人本虛偶因奇遇而悉力勉爲者有之相因相慕日

久而縱竭情慾者亦有之。故於事後則氣隨精去而暴脫不返。宜急搯人中。仍令陰人摎定。用口相對。務使暖氣噓通。以接其氣。勿令放脫。以保其神。隨速用獨參湯灌之。或速灸氣海數十壯。以復陽氣。庶可挽回。

景岳全書

男女交接而死者。男子名走陽。女子名脫陰。男雖死。陽事猶然不倒。女雖死。陰戶猶然不閉。有夢中脫泄死者。其陽必舉。陰泄容猶帶喜笑。爲可證也。皆在不救。龍治集補

諸厥門

尸厥脈動而無氣。氣閉不通。故靜而死也。金匱菖蒲屑內鼻兩孔中吹之。令

人以桂屑着舌下。剔取左角髮方一寸。燒末。酒和灌。令人喉立起。

崔氏凡尸厥爲病。脈動而形無所知。陽脈下墜。陰脈上爭。榮衛不通。其狀

如死。而猶微有息。其息不常。人乃不知。欲殯殮者。療之方。外急以蘆管

吹其兩耳。極盡以氣吹之。立起。若人氣極。別可易人吹之。又方。灸鼻

下人中七壯。又灸陰囊下。去下部一寸百壯。婦人灸兩乳中間。

又方。千金灸百會百壯。

朱砂圓聖惠療尸厥脈動而無氣。氣閉不通。故靜如死。不療三日當死。

朱砂

雄黃

附子各三分

桂心一分

巴豆二十枚去油

右爲末。鍊蜜和圓。如麻子大。每服以粥飲下五圓。不知更下一圓。若利多卽止之。

硫黃散得効尸厥驚然死去。四肢逆冷。不省人事。腹中氣走如雷鳴。命在頃刻。

· 焙硝半兩

硫黃一兩

共爲末。作三服。每服用舊酒一大盞煎。覺焰消起。傾於盞內蓋着。服如人行五里。又一服。不過三服卽醒。兼灸百會穴四十九壯。臍下氣海丹田三百壯。覺身體溫止。又方。用附子七錢。重包煨熟。去皮臍爲末。作二服。用酒三盞。煎一盞服。如無附子。生薑自然汁半盞。酒一盞。同煎令百沸。并灌二服。仍照前灸。惠濟不用焙硝。用馬牙硝。

氣厥卽中氣。因七情內傷。氣逆爲病。痰潮昏塞。牙關緊急。但七氣皆能使入中。因怒而中尤多。中氣之狀。與中風相似。所以別者。風中身溫。氣中身冷。急以蘇合香圓灌之。要訣

氣實而厥者。其形氣憤然勃然。脈沈弦而滑。胸膈喘滿。此氣逆也。理宜以

四磨飲蘇合香丸之類。景岳

四磨飲治療七情傷感。上氣喘急。

人參

檳榔

沉香

烏藥

右各濃磨水和煎服。或服養正丹尤佳。衛生家寶。不用人參。用木香。

痰厥氣虛。身微冷。面淡白昏悶。不知人事。宜順元散。即三生飲。烏附南星並炮。氣盛身熱。

面赤。宜星香湯。即南星木香。見中風門。又用生清油一盞。灌入喉中。須臾逐出風痰。

立愈。見効方。

風涎暴作。氣塞倒仆。本草。用瓜蒂爲末。每用一二錢。膩粉一錢七。以水半

合調灌。良久涎自出。不出。含砂糖一塊。下咽即涎出也。

痰厥者。卒然不省人事。喉中有水鷄聲是也。用牙皂二根。白礬二錢。二味

生研爲末。吹入鼻中。即燒竹瀝薑汁少許。灌入喉中。須臾痰涎逐下立

愈。晉書。蘇敬云。

痰涎發厥。脈弦滑者。二陳湯。加竹瀝。挾寒。加生附子。挾火。加芩連。山梔竹

瀝。凡厥證。爲顛。爲胸仆。爲妄見。或腹脹。二便不利。或嘔。或心痛。皆痰火

鬱氣病也。入門。

痰厥者。因氣逆痰壅。故忽然昏迷卒倒。咽中涎潮。如拽鋸聲。宜先以瓜蒂

散吐之。後用順氣導痰之類藥。證治大要。

痰厥起死回生方。危證簡便。斗大石灰一塊。先入陰陽水。高一二指。候澄清。出

水一小杯。研入麝香一分。攪開牙關。灌下立甦。以尿出腸鳴爲驗。

療痰迷不省人事。危證簡便。

明礬一錢 硃砂一錢

共爲一服。一錢白湯下。又方。明礬末。打陰陽水灌之。再服再吐。極妙。

吐痰丹危證 簡便 善吐頑痰。起死回生。牙關開後。卽宜進此。

生雄黃一錢 膽礬一錢 生滑石一錢

共爲細末。大人五分。小兒三分。白湯調下。一時卽吐頑痰。

食厥者。醉飽過度。或感風寒。或着氣惱。以致填塞胸中。陰陽否隔。升降不通。忽然厥逆。昏迷。口不能言。肢不能舉。若誤作中風。中氣療之。必死。凡遇此等卒暴之病。必須審問。會否醉飽過度。有此。加以氣口脈緊盛。且作食滯療之。先煎鹽湯。探吐其食。吐之後。若別無他證。只用平胃散。加半夏麴蘖之類調理。調

血厥之證有二。以血脫血逆皆能厥也。血脫者。如大崩大吐。或產血盡脫。則氣亦隨之而脫。故致卒仆暴死。宜先搯人中。或燒醋炭。以收其氣。急用人參一二兩。煎湯灌之。但使氣不盡脫。必漸甦矣。然後因其寒熱。徐爲調理。血逆者。血因氣逆。必須先理其氣。氣行則血無不行也。宜通瘀煎之類主之。候血行氣舒。然後隨調理。景岳

通瘀煎景岳

當歸 山查 香附 紅花各二錢 青皮二錢 烏藥一二錢 木香七分

水酒煎服

還魂湯

醫統

療血逆卒厥并產後血厥昏暈目閉口噤惟婦人多有此病

當歸

芍藥

肉桂

乾薑

芍藥

甘草

黑豆炒

紫蘇各等分

右水煎或爲末酒調灌下

芎歸養榮湯

珠玄

有吐衄不知人而厥者此血厥也療之無論其脈急用此

湯或獨參湯以救之

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

黃柏

知母

人參

麥冬

枸杞子

甘草

右水煎服

大怒載血瘀于心胃而暴死者名曰血升逐瘀行血婦人產後經行偶着

恙怒多有之

醫治兼補○寒當致後產乳絕門

寧神散入療失血過多心神昏悶言語失常不得睡臥

辰砂

乳香各五錢

酸棗仁

人參

茯苓各一兩

琥珀七錢半

爲末燈心棗子煎湯調服一錢

酒厥縱飲無節之人多有此病全似中風輕者猶自知人重者卒爾暈倒忽然昏憤或躁煩或不語或痰涎如湧或氣喘發熱或欬嗽或吐血大

便乾燥。脈實。喜冷者。此濕熱上壅之證。進雪梨漿。菹豆飲。以解其毒。原
菹豆飲。原用菹豆不拘多寡。寬湯煮。糜爛。入鹽少許。或蜜亦可。待冰冷。或
厚或稀。任意飲食。若火盛。口甘。不宜厚味。但略煮半熟清湯。冷飲之。尤
善。

雪梨漿

原

用清香甘大梨。削去皮。別用大碗。盛清冷甘泉。將梨薄切。浸於

水中。少頃。水必甘美。但頻飲其水。勿食其粗。

酒厥生薑細搗。自然汁。溫灌喉中。立起之。原

疫厥

亦名瘟
疫暴亡

凡人感瘟疫。視其證脈。尚不至殞命不救。而突然無氣。身直。甚

至無脈。且不可驚慌。視爲告終。此疫厥也。急用臘月雄狐膽。溫水研灌

即活。若牙關已緊。即攪開灌之。雄狐膽。必臘月預爲搗收爲妙。松峯曰。

如得此症。不論有無狐膽。總宜先針少商穴。並十指甲上薄肉。攝出惡

血。並用好猪牙皂末吹鼻。可活。

松峯說疫○案無狐
膽。用真熊膽。亦得。

色厥

見于脫
陽門

乳厥

見于婦
人

癰癰門

是多變緩證。然其發卒暴。故救救一
二應急之方。常與小兒驚風門互攷。

沈香天麻湯

拔

療癰瘰癧。

沈香

益智

川烏

各二錢

天麻

防風

半夏

附子炮各三錢

羌活五錢

甘草

當歸

姜蠶各一錢半

生薑三片水煎

案此方。原出衛生寶鑑。療小兒驚癇。多服連服之劑。後換傷元氣。動則如痴。

潔古云。晝發灸陽蹻申

脈穴。在外踝下陷中。容爪甲白肉際是也。夜發灸陰蹻照海穴。在於足

內踝下陷中是也。先灸兩蹻各二十七壯。然後服前藥。

五生丸類承療癇有神效。

南星

半夏

川烏

白附子各一兩

大豆去皮研二錢半

右爲細末。滴水爲丸。桐子大。每服三丸。至五丸。不得過七丸。姜湯下。

熊參湯本期經

療元氣虧損。癇厥掣攣。

熊膽豆粒許。煎人參湯化開。灌之。

柴胡加牡蠣龍骨湯傷寒類方

此方。能下肝膽之驚痰。以之療癇。癇必效。即仲景原方

柴胡

龍骨

生薑

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

牡蠣

桂枝各一兩半

半夏二合

大棗六枚

大黃二兩

右水煎。

鉤藤湯婦科療諸癇。

橘紅

鉤藤

膽星

天麻

姜蠶

人參

遠志

犀角

石菖蒲

加燈心水煎。臨服加牛黃。

清心湯統療心熱痰迷胞絡。

扶神

黃連各二錢

酸棗仁

石菖蒲

遠志

各一錢

柏子仁

甘草五分

右水煎。痰壅加南星姜汁竹瀝。

禹攻散

油珍

療癩癰卒暴昏憤。不知人事。牙關緊硬。藥不可咽。

牽牛頭末

錢一

茴香二錢半

右爲末。用生薑自然汁調藥少許。灌之入鼻立醒。一方用黑牽牛木香妙。

墜痰丸

衛生寶鑑

療風癰。

天南星

九蒸九曬

右爲末。薑糊丸桐子大。每服二十丸。人參湯下。菖蒲麥門冬湯亦得。

鐵粉散

神巧萬全

療風癩癰。

鐵粉

天竹黃

辰砂

鉛霜各一兩

右細研如麵。無時以竹瀝調下半錢。

二白丸

元戎

療癩與癰。

白礬一兩。以濕麪包蒸熟。去麪。入輕粉三五分。量

虛實加減。丸如桐子大。每服二三十丸。生薑湯下。

療諸癩癰證。俗呼爲牛癩馬癩羊癩猪癩等證。

危難簡便

白礬末五錢。辰砂

末一錢。共爲細末。臨發時。以物撬開口。熱酒一鍾。和前藥灌之。立時一

吐而愈。屢驗。

三因二步導分。名喚心丹。煎人參湯下。療狂證。

五癰膏

本草附方

療諸風取痰如神。

大皂莢半斤。去皮子。以蜜四兩塗上。慢

火炙透搥碎。以熱水浸一時。援取汁。慢火熬成膏。入麝香少許。攤在夾

紙綿紙上。晒乾。剪作紙花。每用三四片。入淡漿水一小盞。沖洗淋下。以

筒吹汁入鼻內。痰涎流盡即愈。立效。

案瑞竹堂方。來麝香。不用蜜及麝香。痰涎近

管或藥。扶病人坐定。微擡頭。以藥次入左右鼻孔內。良久

扶起。痰涎出爲效。欲要促止。將溫鹽湯。令服一二口便止。

中寒凍死門

中寒之證。由平素體氣虛弱。冬月出外。一時爲嚴寒所中。則口噤失音。偏

體拘急。四肢厥冷。畏寒腹痛。脈息沈微。昏沈不知人事者。宜急用熱酒

入生薑汁。和而灌之。候少甦醒。然藥用姜酒。脈出者生。不出者死。更覆

手取之。而無脈則絕矣。

危證簡便

灸法

危證簡便

命蒂穴

即中

丹田穴。關元穴。用艾火。各灸三七壯。手足暖脈至。

知人事。汗出即生。如無汗。手足不暖。不省人事者死。

乾薑附子湯

因三

療中寒卒然暈倒。或吐逆涎沫。狀如暗風。手脚攣搐。口噤

四肢厥冷。或復燥熱。

乾姜炮

附子

右水煎

救凍死方

肘後

以大器中多熬灰使暖。囊盛以薄其心上。冷即易。心暖氣通。

目則得轉。口乃開。可溫尿粥稍稍含之。卽活。若不先溫其心。便持火炙其身。冷氣與火相搏。則死。

凡冬月凍倒人。急與冷水一二口。扶在溫暖處。不得與熱湯。如便與熱物。及向火炙必死。雪泥中行。便近火。卽脚指隨落。奇效良方

又方類集用厚縣被。將凍人捲住睡臥。使二人推來轉去。候血脈和通。身

上漸溫。則活。如無縣被。氈單草薦亦可。

又方救急易方用前法。更以熱酒。或薑湯。或粥飲少許。灌之。卽活。

療凍死已經救活者。奇效良方宜用生薑帶皮搗碎。陳皮搗碎。用水三碗煎一

碗溫服。

冬月溺水之人。及被凍極之人。雖纖毫人事不知。但胸前有微溫。皆可救。倘或微笑。必爲急掩其口鼻。如不掩。則笑而不止。不可救矣。切不可驟令近火。但一見火。則必大笑。不可救藥。洗冤錄

凍倒人。不得近火。近火卽逼寒氣入心而死矣。北方之人。手足凍僵。若湯浴火炙。則肢節脫落。須緩緩搓之。候其回煖。或反以雪搓之。引出寒氣。氣舒煖回。乃愈。卽其理也。醫方

中暑喝死門

中暑悶倒。急扶在陰涼處。切不可與冷。當以布巾衣物等。蘸熱湯熨臍中。

及氣海續以湯淋布上令微臍腹暖即漸醒如倉卒無湯處掘道上熱土於臍以多爲佳冷即易古法道塗無湯即掘熱土於臍上仍撥開作窩子令人更溺於其中以代湯續與解暑毒藥白虎竹葉石膏湯凡覺中暑急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷亂悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立醒因三

中暑爲證面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉切不可
冷水及用十分冷劑蘇合香圓用湯調灌或剝蒜肉入鼻中或研蒜水
解灌之初覺中暑即以日晒瓦或布蘸熱湯更易熨其心腹臍下急二
氣丹末湯調灌下要訣

二氣丹局方

硝石

硫黃

各等分

右爲末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊圓如梧桐子每服四
十丸新井水送下

道路城市間中暑昏仆而死者此皆虛人勞人或飢飽失節或素有疾一
爲暑氣所中不得泄則悶竅皆窒非暑氣使然氣閉塞而死也大蒜一
握道上熱土雜研爛以新水和之濾去滓刺其齒灌之有頃即蘇難經
又方千金張死人口令通以煖湯徐徐灌口中小舉死人頭令湯入腹須臾

卽蘇。又方。使人噓其心。令煖。易人爲之。又方。灌地漿一盞。卽愈。

又方。濃煮蓼。取汁三升。飲之。卽愈。不瘥更灌。又方。乾薑。橘皮。甘草。煮

飲之。稍稍咽。勿頓使飽。

又方。漢書連皮生薑一塊。搗爛。熱湯灌下。卽甦。急卒不得熱湯。以冷水亦可。

又方。漢書皂莢一兩。燒存性。甘草一兩。微炒爲末。溫水調灌之。

療暑證諸藥不救者。至家必用硃砂研細。水調灌下。

有本于陰虛。復遇暑途。飢困勞役。暴仆昏絕者。此暑邪乘虛而犯神明之

府。生脈散加香薷。治暑治

生脈散。辨證

麥門冬 人參 五味子十五粒

右水煎。

甦後冷汗不止。手足尙逆。煩悶多渴者。宜香薷飲。甦後爲醫者。過投冷劑。

致吐利不止。外熱內寒。煩燥多渴。甚欲裸形。狀如傷寒。陰盛隔陽。當用

溫藥。香薷飲加附子。浸冷服。要訣

香薷飲。局方

白扁豆炒 厚朴各半斤 香薷一斤

右水煎服。

曾有客人中暑迷悶。四肢厥冷。冷汗如雨。裸形欲投水中。口吻涎沫流溢。此中暑已深。陰陽離絕難除。要訣

霍亂門

霍亂有兩種。一名乾霍。一名濕霍。乾霍死者多。濕霍死者少。俱緣飲食不節。將息失宜。乾霍之狀。心腹脹滿。攪刺疼痛。煩悶不可忍。手足逆冷。甚者流汗如水。大小便不通。求吐不出。求利不下。須臾不救。便有性命之慮。濕霍之狀。心腹亦攪痛。諸候有與乾同。但吐利無限。此病始得。有與天行相似者。亦令頭痛。骨肉酸楚。手足逆冷。四體發熱。乾霍大小便不通。煩冤欲死。宜急與巴豆等三味丸服之。服取快利。外臺許仁則論

巴豆等三味丸

即三物備急丸。但用巴豆百枚

乾薑三兩

大黃五兩

初

服三丸如梧子大。

鹽吐法

千金

療乾霍亂。心腹絞痛。欲吐不吐。欲下不下。

先以極鹹鹽湯一盞頓服。候吐出令透。不吐再服。吐訖復飲。三吐乃住。靜止。此法大勝諸治。俗人以爲田舍錢近。鄙而不用。守死而已。凡有此病。即須先用之。

薑鹽飲

宜

療乾霍亂。欲吐不吐。欲瀉不瀉。痰壅腹脹。

鹽一兩

生薑半兩

右同炒。令色變。以童尿兩盞。煎一盞。分爲二溫服。

厚朴湯奇效 療乾霍亂。

厚朴

枳實

良薑

朴消

各七錢半

大黃

炒一兩

右每服三錢。水煎服。

吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或水粒不下。或口渴喜冷。或惡寒戰掉。手足冷逆。或發熱煩燥。欲去衣被。此蓋內虛陰盛。却不可以其喜冷欲去衣被爲熱。宜理中湯。甚則附子理中湯。不效則四逆湯。並宜放十分冷服。要訣

薑附湯療霍亂轉筋。手足厥冷。多汗嘔逆。方出中寒門 氣乏。加人參。利不止。加

肉豆蔻。

附子粳米湯金 療霍亂四逆嘔多。

附子一枚

粳米五合

半夏半升

大棗十枚

乾薑

甘草各一兩

右水煎。

回生散百療霍亂吐瀉。但一點胃氣存者。服之無不回生。

藿香

陳皮

右等分。水煎溫服。加良薑甘草。名良薑散。直療霍亂神效。

四順湯金 療吐瀉過多。手足逆冷。六脈沈細。氣小不語。急服。

乾薑

人參

甘草 各等分

筋理中湯如凍膠錢活人書加附子令其繫縛腿脛若筋入腹及通身轉

附

不可療轉筋者以薑汁煖熱浸或用濃鹽湯浸要訣○當與後轉筋門參看

水煎

霍亂轉筋傷胃氣頭旋手足轉筋四肢逆冷用藥遲緩須臾不救命在頃

筋者

四片金

茶黃

木瓜

食鹽 各半

露走

同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸入前件三味炒藥同

刻

升已下傾一盞冷熱當隨病人意與服藥入咽喉即止

吳

療霍亂吐瀉心腹作痛炒鹽二碗紙包紗護頓其胸前并腹

右二

截以熨斗火熨氣透則蘇續又以炒鹽熨其背則十分無事

煎至

腕腕煩則

臍中

灸上

以鹽內臍中

中腕

療腹

天樞

療腹

關元

療腹

鹽熨方

深下利

湧泉

隱白

承山

並療轉

肚上

神祕起死灸法以物橫度病人口中屈之從心鳩尾度以下灸

灸法

五壯橫度左右復灸五壯此三處併當先灸中央畢更橫度左

大都

灸脊以物圍令正當心厭又夾脊左右一寸各七壯是腹背

療霍亂

度下

右出

各灸三處。

華佗療霍亂已死。上屋喚魂者。又以諸療皆至。而猶不差者法。撲病人覆臥之。伸臂對。以繩度兩肘尖頭。依繩下來。背脊大骨空中。去脊各一寸。灸之百壯。無不活者。所謂灸肘椎。空囊歸。已試數百人。皆灸畢即起坐。

外臺

霍亂諸法不效。灸大椎即效。已死但有煖氣者。灸承筋七壯立甦。醫方類聚

霍亂務在溫和將息。若冷則遍體轉筋。凡此病定已後。一日不食爲佳。仍須三日少少喫粥。三日以後。乃可恣意食息也。七日勿雜食爲佳。所以

養脾氣也。千金

霍亂之後。陽氣已脫。或遺尿而不知。或氣少而不語。或膏汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。皆不可療。要訣

攪腸沙門

療攪腸沙。發即腹痛難忍。陰沙腹痛手足冷。看其身上紅點。以燈草蘸油。點火燒之。陽沙腹痛手煖。以針刺其十指背近甲處一分半許。血出即安。仍先自兩臂捋下其惡血。令聚指頭。血即出爲好。衛生易簡痛不可忍。須臾能令人死。古方乾霍亂急用鹽一兩。熱湯調灌口中。鹽氣到腹即定。又將石沙炒令赤色。令水淬之。良久。澄清水一合。一服。或用香油茶吐。

之。

又方

須急遺方

右患痛之人。兩臂腕中有筋。必致黑色。急敲磁器。務取鋒尖者。

一塊。即劈竹筴一隻。微開露磁鋒夾定。以線縛牢。就虛按於左腕中筋之上。却將尺或匙擊之一下。必紫血即出。待食一碗飯間。若痛止。以手摩臂屈之。其血即止。若痛不止。却再於右腕中脈之上。如前法擊之。即可。

又方

衛生易簡

陳樟木

陳皮

醫林集要
用陳艾

東壁土

各等分

右水煎。去滓。連進三四服。即愈。又方。用苧麻。割十指尖。以針挑出惡

血。

又方

醫林集要

先以艾湯飲之。立吐。方是其證。用白礬爲末。白湯調一錢。泡起

服之。

又方

壽域神方

用白蜜馬糞。不拘多少。搗碎。新汲水化下。去滓。頓服一碗。雖曰

穢汚。却有神效。

又方

滋補堂方

以手蘸溫水。於病人膝腕。用力拍打。有紫黑處。以針刺去惡血。

絞腸沙。垂危將死者。尿尿已出。急用芋芳一斤。放在病人口中。咽汁。下喉。

即醒。醒後再喫幾片。亦可生。

秘方集驗

胡椒二十四粒。菜豆二十四粒。同研。

熱酒調服。即愈。鹽少許。置刀頭。燒紅。淬入水中。乘熱飲。即死者亦甦。

凡痧脹夏月多患此證。面色紫赤。腹痛難忍。使飲熱湯。便不可救。卽溫湯亦忌。如遇此證。速取生黃芩。咀嚙嚙下。約至數口。立刻止痛。平人食生芫最引惡心。止在痧脹人。食之反覺甘甜。不知腥氣。此方既可療病。且可辨證。真奇方也。葉天士方

案攪腸沙。始見于危氏得効方。云乾霍亂。俗謂攪腸沙是也。而此所載別是一種病。名同而其候殊異。乾霍亂得吐下而愈。此證則不爾。明末亦呼爲鬼箭。蔣示吉曰。其人衛氣素虛。腠理不密。賊風乘虛而入。客于經絡。經絡閉塞。閉塞則榮衛不通。不通則大痛作。若有鬼以射之也。故服藥之外。用挑血法。總令氣血宣通之意。詳出痧脹主治。今不贅引。

腳氣衝心門

凡小覺病有異。

謂頭暈不仁。或脚腫。或緩緩不健。或強弱不能行。或行卒屈倒。或酷冷疼痛。或覺痺筋等候。

卽須大怖畏。決意

急療之。勿緩。氣上入腹。或腫。或不腫。胸膈逆滿。氣上肩息。急者死。不旋踵。寬者數日必死。不可不急療也。但看心下。急則氣喘不停。或白汗數出。或乍寒乍熱。其脈促短而數。嘔吐不止者。皆死也。金蘇長史曰。脈沈緊者多死。洪數者並生。緩者不療自差。

某黃湯

金

療脚氣入腹。困悶欲死腹脹。

文仲云。

毒氣攻心。手足脈絕。此

亦難濟。不得已。作此湯。十愈七八。外

吳茱萸六升

木瓜兩顆切

右水煎服。或吐或汗。或利。或大熱悶即瘥。此起死回生方。

廣濟療脚氣急上衝心悶欲死。外臺

檳榔三顆細末

生薑汁三合

童子小便二升新者不須燉

右攪頓服。須臾即氣退。若未全差。更服最佳。利三兩行無所忌。

文仲療脚氣冷毒悶。心下堅。背膊痛。上氣欲死。外臺

吳茱萸三升

檳榔四十枚

木香二兩

犀角三兩屑

半夏八兩

生薑六兩

右水煎服。大効。破毒氣尤良。

又脚氣入腹心悶。外臺濃煮大豆汁。飲一大升。不止更飲。大驗。

又療脚氣入心。悶絕欲死者。外臺

半夏三兩

生薑汁二升

右二味。內半夏。煮取一升八合。分四服。

養正丹易簡脚氣之患。入腹衝心。或見嘔吐之證。無法可療。不若用此。更須

多服。以大便流利爲度。此有利性。服之無疑。

杉木節湯易簡方脚氣毒勝疲逆。悶絕喘急。汗流昏塞。搐搦咬齒。上視致垂

死者。惟此湯爲至妙。百發百中。垂死復生。

杉木節新葉一握

大腹子碎七箇

青橘葉剉碎一握無葉以皮代之

分二服。童子小便一小碗同煎。絞汁半碗服之。未通再服。其方出外臺及董汲總論許氏本事等方。但庸醫不透棄而不用之。

三將圓

盧氏續易簡方

脚氣入腹。奔上絞痛嘔吐。用此最捷。

吳茱萸

木瓜

大黃

各等分

右細末。糊圓菴荳大。每服五十圓。米飲下。未應多加圓數。蓋茱萸木瓜。

已是理脚氣要藥。又賴大黃領而宣泄之。爲至巧也。得効方三。大黃隨其病加減。

大戟丸

聖濟

療脚氣攻注。心腹脹滿。小便赤澀。

大戟

芫花

葶藶

各炒

巴豆

續隨子

各炒二錢半

右爲末。蜜丸。梧子大。每十丸。燈心湯下。

案二便閉塞。心腹脹急。因氣致死。屬大毒者。用此宜洩。

唐侍中。療苦脚氣攻心。此方甚散腫氣。極驗。外臺

大檳榔

七枚

生薑

二兩

橘皮

吳茱萸

紫蘇

木瓜

各一兩

右水煎。衛生良劑方。以此方名檳榔湯云。療風濕毒氣。中於足經。遂

爲脚氣。下注兩脚。腫脹疼痛。履地不得。及內攻心腹。手足脈絕。悶亂煩

喘。氣不得息。極有神效。性全毒安方

蘇長史云。脚氣盛發時。自腰以上。並不得鍼灸。當引風氣上。則殺人。若氣

上擊心不退。急灸手心。案即勞宮穴三七炷。氣即便退。若已灸脚。而胸中氣猶

不下。滿悶者。宜灸間使五十炷。兩手掌橫文後。一云。三寸。兩筋間是也。

若胸中氣散而心下有脈，洪大跳，心急忪悸者，宜以手按捺少腹下兩傍，接脾大斜文中，有脈跳動。案即氣衝穴便當文上灸三七炷，跳即定。灸畢皆須灸三里二十炷，以引其氣下也。若心胸氣滿，已灸身脛諸穴，及服湯藥而氣猶不下，煩急欲死者，宜急兩足心下。案即湧泉穴當中陷處，各七炷，氣即下。此穴尤為極要，而不可數灸，但極急乃灸七炷耳。凡灸不廢湯藥，藥攻其內，灸洩其外，譬如開門驅賊，賊則易出。外臺

諸卒失血門

側柏散。衛生家寶療吐血下血，其證皆因內損也。或因酒食太過，勞損於內，或

心肺脈破，血妄行，其血出如湧泉，口鼻俱出，須臾不救。

側柏葉一兩半 蒸干 人參一兩 荊芥燒灰 一兩

右三味為末，每服二錢，入飛羅麪二錢相和，用新汲水調如稀糊，噉服。血如湧泉，不過二服即止。○此方原出中藏經。

花蕊石散。十藥神書療五內崩損，噴血出斗升，用此療之。

花蕊石煨存性，研如粉，以童子小便一鍾，男入酒一半，女入醋一半，煎調服三錢。甚者五錢，能使瘀血化為黃水，後以獨參湯補之。

療諸般吐血。聖濟 朱砂 蛤粉等分 為末，酒服二錢。

療吐血及傷酒食醉飽，低頭掬損肺藏，吐血汗血，口鼻妄行，但聲未失者。

用鄉外人家百草霜末。糯米湯服一錢。劉長春方

暴驚風。九竅出血。其脈虛者。直指靈砂百粒。分三次。人參煎湯下。此證不可

錯認。血得熱則宣流。妄用涼藥誤矣。

療人大驚。九竅四指岐。皆血熱出。乘患人勿知。忽以井華水。猛噴其面

即止。此法。又療衄血如神。本草

療大衄久衄。及諸竅出血。聖人人中白一團。鷄子大。綿五兩。燒研。每服二錢。

溫水服。香說不用綿。只用人中白。味。

凡耳目鼻血出不止。以涼水浸足。貼額貼項。噴面。薄胸。皆妙。本草

山梔子散。本山梔子不拘多少。燒存性。末之。搐入鼻中。立愈。

鼻衄過多。昏冒欲死。本用香墨濃研。點入鼻中。

補肺散。楊氏家法療暴吐損肺。吐血不止。成鍊鍾乳粉

右每服二錢。煎糯米湯調下。立止。如無糯米。只用粳米。

瀉心湯。金療心氣不定。吐血衄血。

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩

右水煎服。加生地犀角。名犀角地黃湯。療熱甚。血積胸中。按

吐血不止。就用吐出。血塊炒黑爲末。每服三分。以麥門冬湯調服。蓋血不

歸元。則積而上逆。以血導血。歸元則止矣。諸證辨疑

衄血不止。用白紙一張。接衄血令滿。于燈上燒灰。作一服。新汲水下。勿用

病人知。聖濟

或吐血。或心衄。或內崩。或舌上出血。如簪孔。或鼻衄。或小便出血。並用亂

髮灰。水服方寸七。聖濟肺疽吐血。髮灰一錢。米醋二合。白湯一椀。調服。三因

鼻血眩冒欲死者。亂髮燒研。水服方寸七。仍吹之。本草附方

人參湯直指療吐血咯血。新羅人參。慢火煎服。

凡一切手足皮膚。偶然血出不止。或鎗刀刺傷。或傷破血管。血出不止。急

用手指緊捺患處。或麻繩紮住半日。或一日。卽住。內急服補氣之藥。爲

妙。危證簡便

婦人產後去血多。傷胎去血多。崩中去血多。金瘡去血多。拔牙齒去血多。

未止。心中懸虛。心悶眩冒。頭重目暗。耳聾。舉頭便悶。欲倒。宜且煮當

歸川芎各三兩。以水四升。煮取二升。去滓。分二服。卽定。展轉續次。合諸

湯療之。千金○案此節局方三因。名尋常湯是。

耳目口鼻竅中。一時出血。藥不及煎。死在旦夕。俄頃。用冷水當面噴幾口。

急分開頭髮。用粗紙數層。蘸醋令透。搭在顙門。血卽止。次以當歸一兩。

煎好。磨沈香五錢。加秋石三錢。服之。如無秋石。以童便和服。亦可。急救丹方○

醫大全。用沈香降香各五錢。不用秋石。唯用童便云。服之血自迴經。然後以四物湯。加人參黃耆五味麥門冬。爲湯服之。可收萬全之功。

卒心腹痛門

附子抽毒脈

積氣鬱管

卒心急痛，牙關緊閉欲絕，以葱白五莖，去皮鬚，搗膏，以匙送入咽中，灌以麻油四兩，但得下咽即甦。少頃蟲積皆化黃水而下，永不再發。累得救

人環寸
堂方

陰毒腹痛，厥逆唇青，卵縮，大脈欲絕者，用葱一束，去根及青，留白二寸，烘熱安臍上，以熨斗火熨之，葱壞則易，良久熱氣透入，手足溫有汗即瘥。乃服四逆湯。若熨而手足不溫，不可療。活人書

必効療蛔心痛方。外熊膽如大豆，和水服大効。

附子建中湯。易療或吐或瀉，狀如霍亂，及冒涉濕寒，賊風入腹，拘急切痛。

即小建中湯，加附子，去膠飴。

神仙沈麝丸。熱沈
良方療一切氣痛，不可忍者。

沒藥

血竭

沉香

麝香

辰砂

各一兩

木香

半兩

甘草

二兩

右爲末，熬甘草爲膏，搜和，每服一圓，薑鹽湯嚼下。

小品解急蜀椒湯。外主寒疝心痛如刺，繞臍腹中，盡痛，自汗出欲絕。

蜀椒

二百枚

附子

一枚

粳米

半升

乾薑

半兩

半夏

十二枚洗

大棗

十二枚

甘草

一兩

右水煎，療心腹痛困急欲死，解結逐寒，上下痛良。

卒得諸疝，少腹及陰中相引絞痛，自汗出欲死，此名寒疝，亦名陰疝。張仲

景飛尸走馬湯亦佳。外臺方見中經

薑鹽湯入門食物填塞心胸作痛宜吐之。當與乾薑

返魂丹十便良方療腸內一切卒暴百病。即三物備急丸。當與乾薑亂五致。

香附散得効療心脾疼不可忍者。

良薑 香附妙各一兩

右爲末。每服二錢。入鹽米飲調下。

療暴心痛。面無顏色欲死方。千金以布裹鹽。如彈丸大。燒令赤。置酒中。消服

之。利即愈。

療急心疼。劉長春方用定粉二錢。葱白二寸。研爛。葱和爲丸。如梧桐子大。每服

七丸。好酒送下。立效。

絳雪散劉長春方療諸心氣痛。不可忍者神效。

朱砂錢一 金箔三 明礬一兩

右爲細末。每服一錢半。輕者一錢。空心白湯送下。

療諸心氣痛。備門事用生礬一皂子大。醋一盞。煎七分服立止。

療腹中疼痛。或寒或熱。或積食。或積血不辨。藥不能施。有起死回生之功。

危證簡便生薑三四觔。搗爛。略擠去汁。入鍋炒熱。用布袱兩箇。先以一箇。包

薑一半。熱鋪痛處。候熱氣蒸熨。冷即易之。勿令間斷。如薑炒乾。以所擠

出薑汁拌之。須輪流換敷。痛止乃已。

療卒厥逆上氣。淹淹欲死。此謂奔豚病。後

生薑一斤

半夏

吳茱萸各一升

桂心五兩

人參

甘草各三兩

右水煎。千金名奔豚湯。療大氣上奔。胸膈中諸病。發時迫滿。短氣不得臥。劇者便憎欲死。

積氣從臍左右起。上衝胸滿。氣促鬱冒。厥者。先用醋炭法。煎膽小豆。白湯化開。調辰砂末五七分。灌之。立醒。本朝經驗

陰冷漸漸。冷氣入陰囊腫滿。日夜疼悶欲死。千金以布裹椒包囊下。熱氣大通。日再易之。以消爲度。

陰核入腹。急痛叫呼欲死。本朝經驗以手挽陰囊。令不上縮。山茶實不拘多少。剉細。水煎服。奇効。

急喉痺門

喉痺垂死。止有餘氣者。巴豆去皮。線穿。內入喉中。牽出。即甦。千金

草烏 皂莢

等分爲末。入麝香少許。擦牙。并搐鼻內。牙關自開。

又方蘇氏

草烏 石膽

等分爲末。每用一錢。醋煮皂莢汁調稀。掃入腫上。流涎數次。其毒即破也。

解毒雄黃丸。局方。解毒。療纏喉風。及急喉痺。卒然倒仆。失音不語。或牙關緊急。不省人事。

鬱金

雄黃 研飛各一分

巴豆 去皮出油十四箇

右爲末。醋煮麪糊爲圓。如菉豆大。用熱茶清下七圓。吐出頑涎。立便蘇省。未吐再服。如至死者。心頭猶熱。灌藥不下。即以刀尺鐵匙。輕開口。灌之。極急選方。爲末。用每服半字。如口噤咽塞。用小管吹入。

急喉痺。其聲如鼾。有如痰在喉嚨者。此爲肺絕之候。用獨參湯。加竹瀝薑汁。又咽痛有陰氣大虛。陽氣飛越。脈必浮大虛。亦服此。香學錄目

小便急閉門

凡飽食後。或忍小便。或走馬。或忍小便大走。及入房。皆致胞轉。臍下急滿不通。亂髮急纏如兩拳大。燒爲末。醋四合。和二方寸匕。服之。千金〇三因云一法。與藥子

等分爲末。飲服一錢。

凡尿不在胞中。爲胞屈僻。津液不通。以葱葉除尖頭。內陰莖孔中。深三寸。微用口吹之。胞脹津液大通。即愈。千金

療胞轉小便不得。千金

葱白四七

阿膠一兩

琥珀三兩

車前子一升

右水煎服。

療小便難小腸脹。不急療殺人。本用葱白三斤。細剉炒令熟。以帕子裹分

作兩處。更替熨臍下。即通。

療小便不通立効方。聖惠

燈心二束

生薑

黑鉛各半兩

右用井華水一大盞。煎取五分。去滓。以葱一枚。慢火燒令熟。拍破。先安

在臍內。後頓服。

療小便不通。腹脹氣急悶。聖惠

滑石研

自己脚手爪甲

燒灰

右以水一大盞。煎滑石至五分。去滓。調指甲灰服之。

螻蛄麝香散。聖惠療小便不通。諸藥無效。

螻蛄活者

一枚

生研入麝香少許。新汲水調下。立通。

葱白湯。得効療小便卒暴不通。小腹膨急。氣上衝心。悶絕欲死。此由暴氣乘

膀胱。或從驚憂。氣無所伸。鬱閉而不流。氣衝胞系不正。

陳皮三兩

葵子一兩

葱白二莖

右水煎

導氣除濕湯

室藥

療小便急閉。乃血滯致氣不通。而竅澁之證。

知母酒洗

澤瀉

黃柏酒洗各二錢

茯苓

滑石為末各三錢

右水煎

療胞轉不得小便。外

吸芥真琥珀一兩

葱白十四莖

右以水四升。煮取三升。去葱白末琥珀。細篩下湯中。溫服一升。日三服。

衛生易簡。不用琥珀。用滑石。

療小便不出。胞轉膨滿欲死者。衛生易簡用亂髮燒灰。冷水調下方寸匕。又

方。用髮灰二錢。滑石末一錢。桃白皮煎湯調下。

小便不通。臍下狀如覆碗。痛悶難堪。療法有二。如氣不能化而不通。則陳

皮茯苓湯。調木香沈香末二錢。空心服。兼用吐法以提之。如血汚於下

而不通。則用桃仁承氣湯之類破之。醫舉綱目

療實熱小便不通。入砂糖水。調黑牽牛末一二錢。服探吐之。

又方。危證食鹽三兩。火煨。和溫水二升。服之探吐。上竅通則下竅自利。妙

法也。

附子散醫療小便不通。尺脈微乃陽虛故也。曾服通利之藥不効。

者宜服此。

附子一

澤瀉一

燈心二十

水煎。

琥珀散

準

療虛人心氣閉塞小便不通。

用琥珀爲末。每服一錢。濃煎人

參湯下有驗。

小便不通。臍腹脹痛不可忍。諸藥不効者。不過再服。聖用續隨子。去皮一

兩。鉉丹半兩。同少蜜。搗作團。瓶盛埋陰處。臘月至春未。取出研。蜜丸梧

子大。每服二三十丸。木通湯下。化破尤妙。病急亦可旋合。

又方

本草

蓖麻仁三粒。研細。入紙燃內。插入莖中。卽通。又方。濕紙包白

鹽燒過。吹少許入尿孔中。立通。又方。蚯蚓搗爛。浸水。濾取濃汁。半碗

服立通。

小便不通。百藥無效。

危證

大蒜甘遂。同搗作餅。貼臍上。以艾火灸二七壯。

極效。

小便急閉。下部脹痛悶亂。

本朝

琥珀油

西

蘸紙燃。徐徐插入莖中。五六寸

許。良久抽出。尿從而通。此法甚捷。

卒暴雜證

轉筋

牙關緊急

舌卒攣

目睛突出

落頰

轉筋入腹欲死者。

葉氏

右以四人捉手足。灸臍左邊二寸。十四壯。

又方。生

薑一兩。擘碎。酒五盞。煮濃頓服。又方。醋煮衣絮令微溫。裹轉筋處。

又方。濃煮鹽湯。通手足。洗胸脇間。

轉筋男子。以手挽其陰。女子以手牽其乳近兩旁。此千金妙訣也。甚則舌

卷卵縮者。難療也。醫集云。○案此法出千金。療霍亂轉筋。

孫尚藥療脚轉筋疼痛掣急。醫集

松節三兩細剉 乳香一錢

和米泔

錢一

右藥。用銀石器內。慢火炒令焦。只留一分性。出火毒。研細。每服一錢。至

二錢。熱木瓜酒調下。同是筋病。皆療之。轉筋而疼。灸承山而可療。經

指南

療人呵欠口不能合。及卒然牙關緊急。水不能入。以致不救。卽死。經方

右用鹽梅二箇。取肉擦牙。卽當口開。若開又不能合。再用鹽梅肉。擦兩

牙注。候開合當止。却須服療風藥調理。

舌卒腫起。如吹泡。滿口塞喉。須臾不療。殺人。華氏原出外書右以指刮破舌兩邊皮。

或刀破。次用釜下墨煤。和鹽塗舌上。用酒調。亦得。

眼睛突出一二寸者。以新汲水灌漬睛中。數易之。自入。本草附方

物傷睛突。輕者臉胞腫痛。重者目睛突出。但目系未斷者。卽納入。急搗生

地黃。綿裹傅之。仍以避風膏藥。護其四邊。聖濟○本朝經驗。以唾餘納入。最妙。

落下頰拿法。患者平身正坐。以兩手托住下頰。左右大指入口內。捺槽牙上端。緊下頰。用力往肩下。捺開關竅。向腦後送上。即投關竅。隨用絹條。

兜頰於頂上。半時許去之。即愈。正宗

凡伸欠頰車蹉。但開不能合。以酒飲之。令大醉。睡中吹皂角末。搐其鼻。嚏

透即自正。三因

笑脫下頰。用線纏綿毬二箇。塞於左右牙床後。用手托上妙。瘡毒

療患乍瘡。用杏仁三分煎熬。別研桂一分。和搗如泥。每用如杏核大。綿裹

合。徐徐熱之。日五夜三服。最妙。瘡毒 又方。用皂莢一挺。去皮子。蘿蔔三

枚。切片。水二盞。煎一盞服之。不過三四服。其聲即出。

耳卒聾閉。芥子末入乳汁。和以綿裹塞之。外瘡

又方。巴豆一粒。紙裹。針刺孔通氣。塞之取效。本草附方 又方。蚯蚓入鹽安葱

內化水。點之。立效。

暴盲氣虛者。用大劑人參膏。血虛者。大劑黃耆當歸煎湯。調服人參膏。濕

者。白朮爲君。黃耆扶苓。陳皮爲臣。附子爲佐。最忌金石墜鎮之藥。以其

神氣浮散於上。犯之必死。張氏醫鑑

瘡毒入腹心。上衝逆滿。元我

萊豆粉半錢 乾胭脂三分 定粉三錢

爲細末。新水調下。神効。

追毒散

宣明

療生瘡發悶。吐衄霍亂。

螺兒膏

甘草

各一兩

白礬

二錢半

右爲細末。每服一錢。新汲水調下。立止。

療惡毒腫。或著陰卵。或著一邊。疼痛變急。引入小腹。不可忍者。一宿殺人。

方。

千金

取茴香草。搗汁飲一升。日三四服。痺傳腫上。冬月闕生者。根亦可。

用。此是外國神方。起死回生神驗。

忽喘悶絕。不能語言。涎流吐逆。牙齒動搖。氣出轉大。絕而復蘇。名傷寒併。

熱霍亂。

得効

大黃

人參

各半兩

右水煎熱服。

婦人急證門

芎歸膠艾湯

金匱

有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。此湯主之。集

驗。療頓仆失蹤。胎動不安。腹痛。

外臺

芎藭

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

乾地黄

各四兩

右水酒煎服。

佛手散

本草

療妊孕至五七月。因事築磕著胎。或子死腹中。惡露下。疼痛不。

已口噤欲絕。此藥探之。若不損則痛止。子母俱安。若胎損立便逐下。此藥催生神妙。

當歸_六 川芎_四

右水酒煎服。口噤灌之。

奪命圓_大 專療婦人小產下血至多。子死腹中。其人增寒。手指唇口爪

甲青白。面色黃黑。或胎上搶心。則悶絕欲死。冷汗自汗。喘滿不食。或食毒物。胎尚未損。服之可安。已死服之可下。

牡丹皮 茯苓 桂心 桃仁 芍藥

右各等分。爲細末。以蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼淡醋湯送下。速進兩圓。至胎腐腹中危甚者。立可取出。_{即金蓮桂枝茯苓圓}

鈴羊角散_生 療妊娠中風。頭項強直。筋脈攣急。言語蹇澁。痰涎不利。或發摘不省人事。名曰子癇。

鈴羊角 獨活 酸棗 五加皮_{各半} 薏苡 防風

當歸 芍藥 扶神 杏仁_{各四} 木香 甘草_{各二}

右生薑五片。水煎。

療諸瘧子癇絕。起死也。當速辦竹作歷汁。_外

芩連四物湯_方 療子癇陰虛火亢。四物湯黃芩黃連半夏_{各等}

生薑水煎

鉤藤湯

大全方

療妊娠八九月胎動不安心腹疝痛面目青冷汗出氣欲絕

此由勞動用力傷胎宮宜急療之

鉤藤

當歸

茯神

人參

各一兩

苦梗

一兩

桑寄生

半斤

右水煎服煩熱加石膏二兩半臨產月加桂心一兩

孕婦忽然顛仆

抽搐不省人事謂之子癇用此湯

金鑑

二合湯

壽世保元

療妊娠忽然口噤吐沫不省人事言語錯亂

四物湯合二

陳加麥門遠志石菖竹筴

黑神散

大全良方

療胎死腹中緣兒死身冷不能自出服之暖其胎須臾胎即

自出

本方有附子無蒲黃

本方見後

加味芎歸湯

幼幼集成

催生及產後最爲穩當功亦鉅大

當歸

一兩

芎藭

五錢

上青桂

二錢

催生但用此三味水煎酒對服立下預防血暈以本方加酒炒荆芥二

錢先將此藥煎好俟胞衣已下隨即服之永無血暈之患

脫花煎

景岳

凡臨盆將產者宜先服此藥并療難產經日或死胎不下俱妙

當歸

七八錢或一兩

肉桂

一二錢

川芎

各二錢

牛膝

各二錢

車前

一錢

水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數杯亦妙

水煎加酒對服若胎死

不下。及胞衣不來，再加芒硝五錢，氣虛困劇者，加人參二三錢，更加附子二錢，無不下者。此方比平胃散加芒硝，出夏方下死胎功勝百倍。集效

療產難及橫生逆產，或血海乾枯，以致胎死不下，惶惶無措，死在須臾。幼

集皮硝五錢 熟附子一錢五分 好酒 童便各半

同煎三沸溫服，立下，百發百中。

趙和叔傳下死胎方。本

桂心末二錢 麝香一錢

右同研，溫酒調服。須臾如手推下。何氏方。無麝香，每用桂末二錢，痛陣密時，用溫童子小便調下。名觀音救生散，兼療產難及橫倒生。

奪命丹集 療胞衣不下，或惡血湊心，其證心頭迷悶，胎衣逆上衝心，須臾不救，其母即死。

附子半兩 牡丹皮一兩 乾漆一分，炒之

右爲細末，以醋一升，大黃末一兩，同熬成膏，和藥圓如梧子大，每服三十丸，淡醋湯吞下。須臾又進二服，其胎衣立下。此藥可預先合下，備急爲奇。

產乳暈絕，含醋嚼嚙面即愈。凡悶即嚙之。金

黑神散局 方療產後血暈，神昏眼黑口噤，瘀血諸疾，血暈，胸腹脹痛，氣粗，外證兩手握拳，牙關緊閉，此血逆也。宜此方。無脹無痛者屬虛，大劑芎

歸湯加肉桂

黑豆炒去皮
半升

熟地

當歸

肉桂

炮薑

甘草

芍藥 蒲黃各四兩

右爲細末。每服二錢。酒半盞。童便半盞。同煎調下。

清魂散產後療產後血暈極甚者。悶絕不知人。口噤神昏。

澤蘭葉 人參各二錢半 荊芥十錢 川芎五錢

右爲末。溫酒調一錢。急灌之。下咽即開眼。氣定省人事。

牡丹散產後療產後血暈。悶絕狼狽。若口噤則拗開灌之。

牡丹皮 大黃 芒硝各一兩 冬瓜子半合 桃仁三七粒

右水煎服。即湯藥大黃牡丹湯是。

獨得散大全良方療產後血暈。昏迷不省。衝心悶絕。五靈脂二兩半炒半生

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。口噤者。拗開灌之。入喉即愈。

產後血暈便產須知 鹿角燒灰出火毒

右爲細末。好酒調下。即醒。行血極快。

氣脫證。產時血既大下。則血去氣亦去。故昏暈不省。微虛者少刻即甦。大

虛者竭絕即死。但察其面目。如眼閉口開。手撒手冷。六脈微細或浮。此

即氣脫證。速用。人參五七錢至三十錢

加入炒米煨薑紅棗煎湯。徐徐灌之。但得下咽。即可救活。若少遲延。則

無及矣。幼幼集成

若兼口鼻氣冷，手足厥冷，此爲真虛挾寒，速宜溫補，每用

人參兩餘，而以薑附佐之，庶得回春，不可忽也。醫學心悟

一婦面白形長，心鬱，半夜生產，侵晨暈厥，急於氣海。清下一寸五分灸十五壯，而甦。

後以參朮等藥，服兩月而安。丹溪集要○案此氣脫證

血運抹療，極宜靜肅，諄叫則死。醫明

六味回陽飲。幼幼集成凡真元已敗，氣血既亡，陰陽將脫，非此莫能挽回，誠回

天贊化第一之功，此景岳新方，知者尙少。

人參一二錢 附子二三錢 甘草一二錢 炮薑二三錢 熟地五錢 當歸三錢

右水煎，加鹿茸數錢，功更捷。

參蘇飲。大全良方療婦人產後，血入於肺，面黑發喘，欲死者。方見蘇門產後氣喘，

極危證也，因下血過多，孤陽上越，用參附湯，若因惡露不行，敗血上攻，

面色紫黑，宜此方。全錄

愈風散。中藏療產後中風，口噤牙關緊急，手足痠癱，如角弓狀，亦療血暈四

肢強直，不省人事，或心眼倒築，吐瀉欲死。荆芥穗輕妙通一兩

右爲末，每服三錢，溫酒調下。豆淋酒調下，用童便亦可，其效如神，口

噤者灌，齒齟噤者吹鼻中，皆效。本草名譽錄古得散是加當歸等分，水一瓊，酒少

許，煎至七分，灌之下咽，卽有生理，不問多少便服，不可以藥味尋常忽

之。屢用救人有效。十便○入門名古劑湯此湯利氣通血脈。其效如神。

乳自出如湧泉。甚而昏暈者。名乳厥。先以獨參湯灌之。更以十全大補湯。

服數十劑方安。證治大遺

小兒急證門

凡有瘳風撮口。胎風撮口。鎖肚撮口。瀉腸撮口。卵疝撮口。皆出結鬱于腸胃。閉不得通。腹中滿脹。肚上青筋。撮口不乳。最爲惡候。一臘內見之。尤急。用紫圓子利之。纔通疾去兒和。用者敬信而已。直按

紫圓千金 赤石脂 代赭石各一兩 巴豆三十枚 杏仁五十枚

右爲末。巴豆杏仁別研爲膏。相和。更搗二千杵。入少蜜。同搗之。密器中收三十日。兒服如麻子大一丸。與少乳汁令下。

龍膽湯千金 小兒初出。面目悉黃。而啼。閉目聚口撮面。口中乾燥。四肢不能伸縮。皆是血脈不斂也。

龍膽 鉤藤 柴胡 黃芩 桔梗

芍藥 茯苓 甘草各六銖 大黃一兩

右水煎灌之。原方有現瀉二枚。今依神巧葛全方。嬰童百問等去之。

療小兒胎熱撮口。聖惠

牛黃細研一錢 竹瀝一合

右令勻時時與少許服之。

瓜蒂散

袖珍小兒方

療臍風撮口。吹入鼻內。啼則可療。又療小兒三歲。忽發心滿。

堅硬。脚手心熱。則變爲黃病。不急療。殺人。

瓜蒂

七枚

赤豆

七粒

秫米

七粒

右爲末。用一豆許。吹兩鼻內。令黃水汁出。殘藥未盡。水調服之。得吐黃水。即瘥。

臍風一成。必有青筋一道。上行至肚。而生兩岔。宜灸筋頭三壯。截住。若見

兩岔。即灸兩岔筋頭各三壯。十活。入九。遲則上行攻心死矣。又法。以小

艾炷。隔蒜灸臍中。

歐氏保嬰錄

急驚屬實熱。宜用清涼。慢驚屬虛寒。宜用溫補。二病若霄壤之相隔。療法

若冰炭之相反。而諸方書。多用一藥。以療二病。何其謬妄之甚也。

活幼心法

噤口散

活幼心法

半夏

生用一錢

皂角

五分

右爲細末。用一小豆許。用管子。吹入鼻立醒。

稀涎散

活幼心法

每服二匙。白湯調下。若牙關緊不可開。即從鼻灌之。

方出中風門

此二方。姑存以備驚風急用。

龍膽湯

千金

療急驚身熱。面赤搐搦。上視牙關緊硬。口鼻中氣熱。痰涎壅壅。

忽然而發。發過容色如故。有偶因驚嚇而發者。有不因驚嚇而發者。然

多是身先有熱，而後發驚搐，未有身涼而發者，此陽證也。方見前

肘後療驚癇癰癰，幼幼新書右取熊膽一兩豆大，和乳汁及竹瀝汁服，並良。

得去心中涎効驗。

柴胡加大黃湯，袖珍小兒方療急驚風，最利痰熱。即小柴胡湯加大黃，量虛實加之

救急驚神方，益德堂方生白石膏研末十兩，辰砂研末五錢，二味和勻，每服

一歲至三歲一錢，四歲至七歲一錢五分，八歲至十二歲二錢，十三歲

至十六歲二錢五分，用生蜜調下。

黑附湯，直指慢脾風之候，面青額汗，舌短頭低，眼合不開，困睡中搖頭吐舌，

頻嘔腥臭，噤口咬牙，手足微搐而不收，或身冷，或身溫，而四肢冷，其脈

沈微，陰氣極盛，胃氣極虛，十救一二。活幼心法云：慢脾風者，即慢驚。失理而甚者，其實難大分別。

附子，酒三錢木香，一錢白附子，一錢甘草，炙半錢

右生薑五片，水煎，以匙送下。加人參一錢半，名黑附子湯，保嬰

虛風湯，幼幼新書療慢驚多因吐瀉，或因久瀉而得之，身冷面或白或黃，不甚

搐搦，目微微上視，口鼻中氣塞，大小便清白，昏睡露睛，筋脈拘攣，此危

證也。

黑附子，南星各一白附子，七全蝎，一

右水煎。

肘後療卒得癇方

外

鈎藤

甘草

各等分

水煎服如小棗大

人參牛黃散

續微論

療小兒驚熱

牛黃

人參

各等分

右爲末以薄荷水調下最佳

琥珀散

嬰童百問

療小兒急慢驚風入口立效驚癇發作常服除根

辰砂

一錢半

琥珀

牛黃

天麻

殭蠶

全蝎

白附子

乳香

蟬蛻

代赭石

煅醋淬七次各一錢

麝香

片腦

牛膽南星

各一字

右爲末薄荷湯下慢驚加附子一分

薛氏摘要去龍腦

紫金錠

類萃

療一切驚風癇證痰涎壅盛功過牛黃等劑

即葛病解毒丸加雄黃辰砂方出中飲食毒門

暴喘俗傳爲馬脾風也大小便噎宜急下之用牛黃奪命散後用白虎湯

平之

醫學綱目

馬脾風在百日內者不理

牛黃奪命散

綱目

療小兒肺脹喘滿胸膈起急兩脇扇動陷下作坑兩鼻竅

張悶亂嗽喝聲噎而不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急療死在旦夕

白牽牛

黑牽牛

各一兩半生半熟

大黃

檳榔

各一兩

右爲細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許無時加蜜

少許

此藥集云：去穢，加枳實。

無價散

目療風熱喘促，悶亂不安，俗謂之馬脾風。

辰砂

一錢 輕粉五錢

甘遂

通裏養陰 乾一錢半

右爲細末，每服一字，用溫漿水少許，入滴油一點，挑藥在上，沈下去却。

以漿水灌之，立效。

入門。名馬脾風散。

又一法，目小兒喘脹，俗謂之馬脾風，又謂之風喉者，以草莖量病兒手中

指裏，近掌紋，至中指尖截斷，如此二莖，自乳上微斜直立兩莖於梢盡

頭，橫一莖兩頭盡頭點穴，灸三壯，此法多會見愈。

小兒生下，有走馬候，甚即遍沾作崩砂候，牙邊肉腫，爛齒齙紫色，口內氣

臭，身微有潮熱，吃食不得，齒縫出鮮血，齒動似欲脫，肉爛自漏落，此候

因肚中疳氣盛而奔上上焦，熱蒸得牙如此，若先落齒一箇即死，不活

先以淡鹽湯洗口內，次搽藥。

譚氏殊聖療走馬疳方

幼幼新書

右用尿桶內白，不拘多少，焙乾爲末，入麝香

少許，研細，揩牙立效。

聖散子

新書療小兒走馬疳。

膽礬

龍膽草

各一兩

右同於瓦瓶中，煨烟盡，略存性，貼瘡上，入藥香少許，名黑神散。

雄黃散新書 療走馬疳。

雄黃兩半

水銀

銅綠各半錢

麝香半錢

右先將雄黃同水銀研令星盡次入銅綠麝香研勻細先用鹽漿水搽患處搗冷乾次貼藥有涎吐之先翳去死肉貼藥其效甚捷。

檳榔散新書

檳榔

大黃

青皮各一分

黑牽牛一錢

木香少許

右爲末每服一錢薄荷蜜水下。

牛黃散新書

甘草二兩

鬱金一兩

馬牙消半兩

朱砂二錢

右爲細末袞件令勻每服一錢或半錢新汲水調下。

右二方並療走

馬疳。

黃連解毒湯

兒科方要

療牙疳清血中之熱瀉胃中之火。

黃連

甘草

玄參各一錢

射干半錢

貝母

桔梗

連翹各七分

生地八分

犀角水磨一錢藥熟入

水煎服。

三黃犀角地黃湯

本朝經驗

走馬疳宜速服之。

卽三黃湯合犀角地黃湯。

療卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡

五處各灸三壯仍用酒和胡粉塗其腹。

得效

小兒暴腹滿欲死半夏不以多少微火炮爲末酒和爲圓如粟米大三五

粒。炭薑湯。或蜜湯下。得效

小兒中惡暴死。葱白納下部。及鼻中立活。或用菖蒲著舌底。及吹入兩鼻。
兩耳中効。得效

救急選方下卷

疔瘡急證門

程山齡曰。療疔之法。貴在乎早。初起即療者。十全十活。稍遲者。十全五六。失療者。十全一二。內服莫妙於菊花甘草湯。外科十法

甘菊花四兩 甘草四錢

水煎頓服。渣再煎服。

消疔簡便方。大疔瘡及諸惡毒初起。但未成膿者。服之神效。

白礬可三錢 葱白七莖

右同搗極爛。分作七塊。每塊用熱酒一杯送下。服畢。用厚被蓋之。再進葱白湯一鍾。少頃汗出如淋。從容去其覆物。其病如脫。此雖味醞難服。其效甚妙。

萬靈奪命丹。大療一切疔毒入腹。煩悶惡心。并癰疽發背惡瘡。

朱砂飛水 蟾酥人乳 輕粉 膽礬各五錢

銅綠 血竭各一兩 雄黃 枯礬各二兩

共爲細末。麝糊丸芡實大。每服一丸。令病人先將葱白三寸嚼爛。吐在掌心。將丸包在葱內。熱湯吞下。出汗。

疔毒已篤者。二服即愈。丹方

土蜂房具一 蛇蛻條一

黃泥固濟。燒存性爲末。每空心好酒服一錢。少刻大痛。痛止其瘡已化爲黃水。

追疔奪命湯急教仙方 能內消腫毒。

羌活 獨活 防風 青皮 黃連 芍藥

細辛 甘草 蟬退 僵蠶 澤蘭 金線重樓

右等分水煎。加少酒服。以衣被蓋覆。汗出爲度。病退減。後再加大黃。利一兩次。以去餘毒。

黃連解毒湯正宗 療疔毒入心。內熱口乾。煩悶恍惚。脈實者。

黃連 黃芩 黃柏 山梔 連翹 甘草 牛蒡子各等分

燈心二十根。水煎服。

救命仙方外科要 療疔毒走黃。打滾欲死者。一服見效。

牡蠣 山梔 銀花 木通 連翹 牛蒡子

乳香 沒藥 角刺 瓜蒌仁 大黃 地骨皮各八分

右水酒煎。便秘者加朴消。即正宗疔毒復生湯。花粉代瓜蒌仁耳。

太乙紫金丹正宗 解諸毒。療諸瘡。真能起死回生。方出飲食中藥門。

疔瘡生根入腹者便死。用磨針刀鐵漿水一碗。絲綿濾淨。銀鍋內煎三四沸服之。病者須臾腸鳴。行利一二次。蘇醒方妙。蘇醒方妙。蘇醒方妙。蘇醒方妙。托裏護心散。蘇醒方妙。蘇醒方妙。蘇醒方妙。療諸疔疽發背。會經汗下。毒氣攻心迷悶。嘔而痛。二三服而安。

乳香一兩 葶豆粉四兩

右細末。每服三錢。甘草湯調下。此方原出干精要。

金瘡癰撲門

傷重昏憤者。急灌以獨參湯。雖內瘀血。切不可下。急用花蕊石散內化之。方出李失血門恐因瀉而亡陰也。凡瘀血在內。大小便不通。用大黃朴硝。血凝而不下者。急用木香肉桂末二三錢。以熱酒調灌服。血下乃生。若口噤手攣。遺尿痰盛。唇青體冷者。虛極之壞症也。急投大劑參附湯。多有得生者。正體類要

參蘇飲類要療出血過多。瘀血入肺。面黑喘促。

人參一兩 蘇木二兩

右水煎服。

鷄鳴散三因療從高墜下。及木石所壓。凡是傷損。瘀血凝積。氣絕欲死。

大黃一兩 杏仁二七箇

右研細酒一盞煎至六分盞振去滓。鷄鳴時服。次日取下瘀血即愈。若便覺氣絕不能言。取藥不及急。擊口開。以熱小便灌之。

療亂打血攻心。醫法指南

大黃

當歸

蘇木

紅花各三分

酒水各半煎服。寒斯方。勝於大成湯。

凡被打損。血悶搶心。氣絕不能言。可擊開口。以熱尿灌入口中。令下咽即醒。又墮車落馬。及車碾木打已死者。以死人安著。以手袖掩其口鼻。眼上一食頃活。眼開與熱小便二升。千金

跌撲傷損。去血過多。脈微欲死。獨參湯加重便。接住元氣再處。大法傷損及金瘡失血過多。與產婦同。脈來和緩者生。急疾扎者死。宜虛細不宜數實。醫治大寶

摧壓跌打。從高墜下。及竹木所碰。落馬撲車。氣沈重。取藥不及。擊開口。以熱尿灌之。用半夏末吹鼻。以艾灸臍。再將患人盤膝坐住。將髮提起。使氣從上升。則可活矣。類集

又方。危證簡便皂莢末。急吹入鼻。亦可。如活即以生薑汁和香油打勻灌之。

療人被人打死。或踢死。危證簡便急取百會穴。艾灸三壯。立甦。撲打墜損。惡血攻心。悶亂疼痛。救急方用乾荷葉五斤。燒令烟盡。空腹以童

便溫一盞調下三錢

傷經砍斷血筒血出如湧泉者是。集書銅末敷之。又用葱一斤炒乘熱熨

之。

自刎者乃迅速之變。須救在早。遲則額冷氣絕。必難救矣。氣從口鼻通出。

生薑片五

人參錢二

白米合一

煎湯灌之。接補元氣。急用縫合法。宗正

自行被擗穿斷舌心。血出不止。以米醋用鷄翎刷所斷處。其血即止。仍用

真蒲黃杏仁去皮尖。研砂少許。研爲細末。煉蜜調藥。稀稠得所。噙化而

安。得效方

順血散。本朝經驗療一切金瘡撲損。及產後血暈。

當歸

芎藭

芍藥

蒲黃

澤瀉

枳殼

人參

大黃

沈香

茯苓各一錢

甘草三分

接骨木錢五

右劉細。每服二錢。入麻布袋。用沸湯擺服之。

五金所傷。並竹木刺。流血不止。上身被傷。急以銀一錠。燒紅烙傷處。如下

身。急以鉄一塊。燒紅烙傷處。其血立止。此急救良方也。傷書大全

可法良規云。凡傷損之症。若誤飲涼水。瘀血凝滯。氣道不通。或血上逆。多

致不救。若入於心即死。急飲童便熱酒以和之。若患重而瘀血不易散

者更和以辛溫之劑。睡臥要上身墊高。不時喚醒。勿令熟睡。則血庶不上逆。故患重之人。多爲逆血填塞胸間。或閉塞氣道。咽喉口鼻。不得出入而死。傷醫大全

破傷風門

大豆紫湯金療破傷風。入四體角弓反張。口噤不能言。或產婦墮胎。凡得此者。太重不過五劑。

大豆斤五 清酒斗一

右二味。以鐵鑊猛火熬豆。令極熱焦煙出。以酒沃之。去滓。服一升。日夜數服。服盡更合。小汗則愈。

破傷風。瘡口作白痂。無血者殺人。最急療之。葉氏方 右以雄鼠糞。直者是。研

細熱酒調半錢服。

鎮風散正療破傷風。諸藥不効。事在危急者。用之必應。

鱉膠性寒 微焙 杭粉性溫 煨黃即 宮粉 皂礬炒紅 各一兩 朱砂三錢 別研

爲細末。每服二錢。無灰熱酒調下。外灸傷處七壯。知痛爲吉。如一切猪羊癩風。發時昏倒不省人事者。每服三錢。二服。即愈不發。

玉真散本療風自諸瘡口入。爲破傷風。項強牙關緊欲死。

防風 天南星

右爲末。每服三錢。童子小便一大盞。煎至七分。熱服。三因名打傷至死。但

心頭微溫。以童子小便調下二盞。并三服。可救二人性命。

香膠散三因療破傷風。口噤強直。魚膠燒七分

右研細。入麝香少許。每服二錢。酒調下。不飲酒。米湯下。或以蘇木煎湯下。

破傷風。血凝心針入肉。三症。如神方。難治大難烏鴉紐。燒灰存性。細研。服一錢。

滾湯下。

大芎黃湯活法療破傷風在裏者。宜疎導。

川芎 羌活 黃芩 大黃各二錢

右水煎服。臟腑通和爲度。

湯火傷門

凡火燒損。慎勿以冷水洗之。火瘡得冷。熱氣更深。轉入骨壞。人筋骨難痊。

初被火燒。急向火更多。雖大痛強忍之。一食頃。即不痛神驗。千金

火氣入腹熱悶。柳葉一升。煎湯服。萬全

火燒欲死。廣集煮好酒三盞。入浴缸內。令患者沒酒中。極重不死。

療人卒中烟火毒。用黃豆醬一塊。調溫湯一碗。灌之。即甦。本草療人遭火

燒身爛垂死者。用臭醬一兩。取水白酒一二甕。將酒頓溫。不可過熱。調

醬於中令患者浸酒中燒極重不死。

天啓甲子秋八月。救湯火藥發。燒死藥匠數百人。內十餘人。遍體赤爛。未死者。令行

此方。便結如數。

療火傷

附後

破鷄子取白塗之。又取煖灰以水和。習習爾以敷之。亦以灰汁

洗之。

又方

衛生易簡

凡湯燒先用鹽末搽之。護肉不壞。後用藥傅。

又方

本草附方

用瓶盛麻油。以筋就樹夾取黃葵花收入瓶內。勿犯人手。密封

收之。遇有傷者。以油塗之。甚妙。

平時收老黃瓜。不拘多少。覓厚實磁瓶貯之。藏暗濕處。自爛爲水。將此水

塗湯火傷處。立時止痛。可不起泡。此余幼時墜入烈火。半體皆傷。連療

不効。得此方愈。

清涼散

奇方類活

治湯火燒敷之止疼立愈。

大麥淨沙鍋內炒。至漆黑

爲度。取出以紙鋪地上。出火氣。研細末。爛者乾搗。未破者。以香油桐油

調搗。

療湯火傷

暴傷知要

鷄黃油。如法取傅。

法用鷄子。不拘多少。煮熟去白留黃。

入銅杓內。每十箇加菜油一小酒盞。煎枯去渣。出火氣。用傅。甚佳。諸齋

陳君。每月藥油救人。卽此也。

湯煎膏火所燒

外臺

熟搗生胡麻如泥。以厚塗瘡上。

滾湯煎膏所灼。火焰所燒。外牛糞新者。和以鷄子白塗之。比常用之。亦不
作瘡。不痛。神效。

火湯熱油傷。公鷄子清油調淋洗。或用蜜塗。

火藥傷。危取鷄蛋清。多年陰溝泥。和勻傳神效。又方。先弔臘酒冷洗。

以拔其毒。再以鷄子十數箇。熟去白。以黃炒焦黑。取油約一盞。用大黃
研末二兩。和勻傳上三日全好。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。金療火邪。

桂枝三兩 甘草二兩 生薑三兩 牡蠣五兩 龍骨四兩 大棗十二枚 蜀漆三兩

右水煎。

玄妙飲。丹療湯火所傷。先服。恐火毒攻心。

黃連 花粉 玄參各二錢 陳皮 桔梗 山梔各一錢

竹葉十片。水煎。如藥不便。只用好酒溫洗。拔其熱毒。內服童便。以護其
心。使火毒不內攻。隨取大黃末。桐油調敷。即垂危者。皆保無恙。

逐火丹。石室療無意之中。忽爲湯火所傷。遍身潰爛。與鬼爲隣。服之可以
變死而生。

當歸四兩 茯苓 黃耆各三兩 大黃

甘草各五錢 荆芥炒 黃芩 防風各三錢

下卷 湯火傷門

右水煎

火燒湯潑。粥湯油燙奇方。

傷毒大全

平日泡過茶的茶葉。剩下的茶脚。不拘甚

的粗細茶葉。用瓦罈一個。放朝北地上。日逐裝在罈內。聚之已滿。用大

磚一塊蓋好。須得一年。用之方妙。愈陳愈好。凡遇上症。不問已潰未潰。

搽上即定痛結疤。第一驗方。

火燒滾湯起泡。

傷毒大全

陳蕎麥麵。打糊裱上。立止疼痛結靨。

滾粥燙傷。

傷毒大全

錫箔遍貼神效。如受傷重者。可嗅溫香油一鍾。

顧世澄曰。凡被火傷之人。宜用羌活一兩煎服。俾火毒得汗外泄。庶免內

攻。

傷毒大全

咬傷門

人齒咬破指頭。痛不可忍。久則爛脫。手指并手掌。諸方不載。急用人尿。使

瓶盛之。將患指浸在內。一宿即愈。如爛者用龜殼燒灰敷之。如無龜。用

龜殼燒灰搽敷。亦可。

壽世保元

人咬傷者。用龜板或龜甲。燒存性爲末。以香

油調搽。

奇效單方

又方

危證簡便

咬時一日內。先用熱小便浸傷處。洗淨牙黃瘀血。次以龜板或

龜甲調搽。若腫痛熾發。疼甚者。亦與童便浸洗拭乾。用粗草紙燃。蘸麻

油點火。用烟焰薰腫痛上。良久方住。以解牙毒。如臭腐淋漓。用葱白三

兩粉草五錢煎湯。每日洗淨。再用藥搽。

又方

集驗

人咬。用塘鷄屎塗咬處。立刻止痛。不成膿。

又方。用生栗子。嚼

爛敷之。

又方

丹方

用熱尿洗去牙黃瘀血。以蟾酥丸塗入孔中。或嚼白菓塗之。如

痛用麻油紙燃。火焰薰之。用乾人糞裝荔枝殼內。安定咬處。加艾團灸之。以不痛爲度。

又方

危證

人咬指。用飯店內陳久快子。

案即

頭數十箇。燒灰存性。研細。用

米湯調。做一箇套子套上。雖極重者。亦可救。

療獾犬咬人方

肘

先嚼却惡血。灸瘡中十壯。明日以去。日灸一壯。滿百乃

止。案謂却惡血。人不肯爲之。宜用角法明之。

又方

後

生食蟪蛄。絕良。亦可燒炙食之。不必令其人知。初得嚙便爲之。

則後不發。

又方

千金

急用鍼刺去血。以人小便洗淨。用胡桃殼半邊。以人糞填滿。掩其

瘡上。着艾灸之。殼焦糞乾。則易之。灸至百壯。次日又灸百壯。灸至三五

百壯。爲佳。

出東晉醫家案。千金無所載。

又方

聖

杏仁去皮尖研。作湯頻服之。良。又方。黑豆煮汁服之。甚良。

又方

奇效

急於無風處。以冷水洗淨。即服韭汁一碗。隔七日又一碗。四十

九日共七碗。百日忌食。徐本齋云。風犬一日咬三人。止一人用此方得活。親其驗。一用膽礬末。傳患處立愈。秘方集驗云。並菜汁一椀服之。百日內常食並菜。更妙。○此原出千金。

又方諸全備急將番木鱉子。煨灰一錢。熱酒調服。

又方集驗番木鱉一錢。銅鍋炒。雄黃四分。爲末。冷水調三分五釐服之。大

小便出血即愈。

又方奇方類編番木鱉三箇虎脰骨三錢甘草一錢

右水酒各半煎服。

又方毒域用生杏仁。搗爛傳之。立效。千金療凡犬咬。杏仁熬黑研傳。

療顯犬所傷。或經久復發。無藥可療者。用之極驗。醫方大成

明雄黃錢五真麝香分五

右研勻。用酒調二錢服。如不肯服者。則燃其鼻而灌之。服藥後。必使睡。

切勿驚起。令其自醒。候利下惡物。再進前藥。則見效。

犬咬涎入瘡。令人昏悶。浸椒水。調莽草末塗之。本草附方

療風狗咬本朝經驗鐵砂錢一番木鱉分六甘草分五

右水煎服。小兒減半。若過劑。令人迷悶不醒。

又方本朝經驗急用熱小便。洗淨咬處。生杏仁研爛封之。日一換。宜服

防風 升麻 葛根各五分杏仁錢一甘草分一

右水煎此方甚效。

又方

本朝經驗

灸咬處宜服

金銀花錢五

木鼈

檳榔各三錢

白芷

橘皮各二錢

番木鼈

礬石

杏仁

甘草各五分

右水煎或加鐵漿一七或加菲汁爲妙。服此藥每五日內再用寬中丸瀉下五七行下盡毒爲度。

狗咬寬中丸

青黛

百草霜各三錢

檳榔

木鼈

杏仁

黑牽牛

黃連

番木鼈

黃芩

大黃

雄黃

鐵粉各一錢

巴豆四十粒

右爲細末稀糊爲丸。大人三十丸。小兒十丸。白湯送下。以上二方神效無比。

衆療不差。毒攻心煩亂。喉已作犬聲者。天靈蓋燒灰末。以東流水和服方寸匕。以活止。外書云。喉。音。重。多有也。

又方

本朝經驗

斑蝥五分

大黃一錢

甘草二分

右爲末。水調下。不肯飲。擦鼻灌口內。當救萬一。

凡風犬咬者。百日內忌飲酒。忌食鷄鵝羊猪肉肥膩諸口味。及發風毒物。麻物赤小豆俱不可見。一年勿食茄子。終身忌食狗肉。造藥簡便蕎麥赤小豆三年勿食之。青梅實。百日勿食之。

崔氏云。凡初被咬。即覓一切物與嗅。後不發也。

外臺

療常犬咬人。傷處毒痛心悶。

聖惠

杏仁半兩生用

桃白皮一兩剉

右水煎服。當吐狗毒差。

療狗咬人。

聖惠

以火灸瘡中腫上。搗韭汁飲三合。日三五度。瘡差即止。

又方。

危瘡簡便

先用米泔水洗傷處。令極淨。再以杏仁口內嚼爛敷之。以帛縛

之。即差。又方。松香爲末。傅之。極効。

凡犬傷人。量所傷大小。杏仁爛咬。沃破處。以帛繫定。至差無苦。

本草衍義

又方。

危瘡簡便

白礬納瘡中。裹之。止痛速愈。

又方。

回春

銀杏塗傷處。

又方。

油珍

蓖麻子五十粒。去殼。以井花水研膏。先以鹽水洗咬處。乃貼此膏。

危瘡簡便續方云。草麻仁研如膏。先以鹽水洗淨敷上。即愈。

又方。

山居便宜

燒蟾蜍爲末。傅之。

狗咬血不止。急以砂糖塗之。立愈。

博聞類纂

犬咬傷。瘡重發者。用蔓青根搗汁服之。

後肘

又方。以蠟炙溶。灌入瘡中。

山居便宜

云。搗生薑。分服之可解。

療狗咬極重者。雖遍身咬碎。搽立刻止疼神効方。

續危瘡簡便方

用蚯蚓搗爛搽敷。

狗咬眼內。以帕縛之。數日令愈。奇驗。

療犬咬傷不可便貼膏藥及生肌類閉毒於內也當先用舟車丸禹功散

通經散等藥隨便服利十餘次腫減痛止後方敷貼醫門事親

療貓兒咬一百研薄荷汁塗之立効

療貓咬傷人常有隔窗放尿被貓咬其陰頭其人將死用老鼠糞燒灰麻

油調傅立効豈非物類相感而可以相制乎壽域神方

療貓咬本朝經驗雄黃末水調塗咬處若貓毒不盡寒熱時發或遍身發斑

者用鼠毒神方兼服紫金錠甚効

療鼠咬聖惠麝香封咬處上以帛繫之

又方善域用砂糖調水冷服立効又方貓屎揉之即愈

又方危靈桐油塗之先以鹽湯洗淨次傅藥

又方藥方斑整燒灰麝香少許津唾調敷

又方本朝經驗急以火硝盛咬處點火發之以散毒氣次將牡蠣石灰黃柏三

味爲末調繁縷汁塗咬處服後方

鼠毒神方本朝經驗療鼠咬毒或經久寒熱淋瀝如勞或遍身發紫赤斑或骨

節疼痛精神不爽

當歸 芎藭 生地 芍藥各一錢 沉香各五分

茯苓七分 紫檀八分 白檀六分 甘草二分 千屈菜八錢六分

右每帖二錢。水煎服。忌食一切油膩動風物。若發斑於其上以鍼去

惡血兼服紫金錠。亦療貓咬毒

柞木皮湯。本期經驗療鼠咬傷。

柞木皮錢二當歸分三

川芎分三

金銀花錢一

大黃分五

甘草分一

右水煎服。柞木即櫟也。實名橡斗者是。

療馬咋及踏人作瘡。有毒腫熱疼痛。時灸瘡中及腫上即差。

又方。外蓋割雞冠血點所嚙瘡中日三。

又方。救急易方灸訖或人尿或馬尿或鼠尿燒爲末和猪脂但取一味皆可傅。

又方。用益母草細切和醋炒封之。

又方。醫說用栗子細嚼敷之立效。

又方。秘方集驗艾灸傷處內服蘇木湯一碗即止痛。服童便韭汁亦妙。寒水

石末敷傷處旬日亦愈。

馬咬毒入心用馬齒莧煎湯服之立瘥。聖惠

馬咬成瘡腫痛石灰傳之效。危難便

猪嚙人。千金鍊松脂貼上。山居便宜云。以松脂鍊作餅子貼之。以兩端定。

云。即今之承漏也。

又方。危難便梓樹葉搗敷之。

猪咬成瘡

本草附方

龜板燒研香油調搽之

療蛇咬方

十便

大衍方云黃蠟鎔化滴瘡口內蛇齒有四凡咬處必有四竅

每竅滴入黃蠟應時不痛其毒立散經時毒氣已入腸胃者用黃蠟爲

丸菴豆大研雄黃爲衣酒吞下十圓或十五圓毒氣內消

又方

丹溪心法

急以小便洗出血次取口中唾塗之又以牙塗封傷處傳而護

之甚妙且不痛腫

山居四要云用犬糞處亦佳

路行卒被蛇咬當急扯裹脚帶扎縛傷處上下寸許使毒氣不能橫傷肌

體又急用白礬安刀頭火上溶汁沸滴於傷處待冷以長篦子速挑去

膿則毒血隨出黯腫尙未退更滴之以退爲度村居山僻及途中夜行

卒被蛇傷咬難來白礬處速作艾炷灸五壯以唾調鹽塗之如黯腫尙

未消當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人蜈蚣咬亦宜灸

醫學綱目

趙延禧云遭惡蛇所螫卽帖蛇皮便於其上灸引去毒氣卽止

醫學綱目

療蛇咬

醫學綱目

細辛

五錢

白芷

五錢

雄黃

二錢

麝香

少許

右爲末每服二錢溫酒調服

蛇傷潰爛百藥不愈以新水數洗淨腐敗見白筋搥乾以白芷末入膽礬

麝香少許搽之惡水漏出數十日平復

夷堅志

回生酒

醫學綱目

療毒蛇所傷至死杠板歸不拘多少研爛用汁與生酒調服

隨量飲之。渣貼患處立已。

療蛇咬

聖惠

白礬

甘草

各一兩

右爲散。如蛇螫着之時。心頭熱躁。眼前暗黑。用新汲水服一錢。卽止。

堂方名解毒散

又方

救急易方

急於無風處。以麻皮縛咬處上下。刀剗去傷肉。小便洗令淨。燒

鐵物烙之。然後填蚯蚓泥。次填陳年石灰末。絹扎住。輕者針刺瘡口。并

四旁出血。小便洗淨。以蒜片着咬處。艾灸三五壯。

又方

頤頤

用藍葉搗汁。調雄黃末敷之。或用雄黃一錢。生礬二錢。杵內溶化。

將筋頭蘸藥傷處。冷則易之。連點七次。若毒走腫痛者。以麻油焙熏之。

再用解毒紫金丹一錢。酒磨服之。取汁。

魚腥草

即蕺菜

療蛇傷。用之輒愈。亦解蠱毒。

吳軍

毒蛇咬。烟袋燒熱。滴油搽之。百試百效。

傷毒大全

又烟袋內油。塗四邊腫處。卽

消。切不可塗咬傷孔內。

又方

本朝經驗

生柿。及柿餅。搗爛。傅咬處。極効。若無生柿及柿餅。用柿漆亦佳。

蛇咬。忌食酸物。梅子。犯之大痛。

醫藥類目

療卒爲蛇繞不解。以熱湯淋之。無令人尿之。

療蛇入口。或入七竅。

千金

一人因熱逐涼睡熟。寤着有蛇入口中。挽不出。用

刀破尾入生椒二三粒裹着須臾自出。

又方時艾炙蛇尾即出。若無火以刀周匝割蛇尾截令皮斷乃將皮倒脫

即出。至道方云蛇出後急以雄黃朱砂細研煎人參湯調下灌之取

蛇毒十便

蛇入七竅劈開蛇尾納川椒數粒以紙封之其蛇自出更煎人參湯飲之

或飲酒食蒜以解內毒如被蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加艾

於蒜上灸之其毒自解凡毒虫傷並効。口齒類要云。急以手捻定。用

自出。不
可拔。

又方湯醫以針刺其尾不過二三針則蠅出。

蜈蚣螫人後割雞冠血塗之差。又嚼鹽塗之効。又嚼大蒜若小蒜以塗之。

又方外按藍汁以漬之即差。又方取錫炙令熱以熨之不越十度即差。

又方聖取蝸牛捺取汁滴入咬處須臾自差此方神驗。又方取蠟少許

將筆管坐所咬處鎔蠟滴向管內令到創上三四滴便止。

又方衛生以生薑汁調雄黃末貼傷處瘡。又方用燈草蘸油點燈以烟

薰之不問他毒虫傷皆可用此方極驗。毒瘡方云。用筆管一箇。合在瘡處。用紙

薰傷處

又方從方用艾於傷處灸三五壯拔去毒即愈。

中蜈蚣毒。舌脹出是也。雄雞冠血浸舌並咽之。一男子爲蜈蚣入咽喉中咬之。垂死之際。一醫令殺生雞。血乘熱灌喉中。蜈蚣即出而愈。實良方也。

也。青森莊暴

蜂螫人。肘後取人溺新者洗之。差。又刮齒垢塗之。

又方。千金以淳醋沃地。取泥塗之。

又方。救急易方用醋磨雄黃。塗傷處。

又方。本草衍義用生芋梗塗之。立効。又生芋頭。刮汁傳之。事候筆談

又方。醫法指南用吐沫調硃砂擦之。又療蜈蚣傷。

療壁宮咬。聖惠取青麻葉心七枚。以手撻令汁出。塗之。差。又方。硃砂雄黃。

各半兩。同細研。挑破瘡。內藥在瘡中。

又方。類體壁虎咬傷。最難救療。以青苔塗擦。再用敗毒散。加青苔三錢煎服。

蜘蛛咬。外臺取生鐵衣。以醋研取汁。塗之。差。

又方。千金以烏麻油和胡粉。如泥塗之。乾則易之。取差止。

又方。外臺以蒜摩地。取泥塗之。

又方。聖惠雄黃一分麝香一分藍汁一大匙

右爲末於藍汁中。以塗咬處。立差。又方。嚼薤白傳。立効。又方。嚼續

隨子傳之。立差。

又方直縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化爲水自

瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙

又方

本草附方

烏雞屎浸酒服又取冠血塗之

又方

醫學綱目

蜘蛛咬諸般虫咬用葛粉生薑汁調傳

壁鏡毒人必死

西陽雜俎

桑柴灰三度沸取汁調白礬末爲膏塗瘡口即差

又方

救急易方

醋磨雄黃塗之妙

又方

本草附方

用大黃研醋水塗傷處立效

毛蟲螫人

本草附方

赤痛不止馬齒莧搗熟封之妙

又方

醫學綱目

雜色毛虫極毒凡人觸着則放毛入人手足上經數日瘡在外

而痛在內骨肉皆爛有性命之憂此名射工毒諸藥不効用鍋底黃土

爲末以酸醋捏成團於瘡痛處搓轉其毛皆出在土上痛瘡立止神効

無比

黃土即伏體肝也

又取蒲公英根莖白汁傳之立瘡

又方

危微

甘草口內細嚼傳之立時愈又方如肉已爛用海螵蛸爲末

傳之愈

經方

療惡蟲咬

聖惠

蛇蛻皮煮湯洗三兩度又燒灰水和傳瘡上又方紫草浸

油塗之

療蛇毒及一切虫傷但有小氣可以下藥即括神效

千金

麥門冬煎湯調香

白芷末服之。腥穢黃水自口中出。

凡蛇傷蟲咬。倉卒無藥去處。以大藍汁一碗。雄黃末二錢調勻。點在所傷

處。併令細細服其汁神驗。如無藍。以澱花青黛代之。說

療諸蛇蟲傷毒。用青黛雄黃等分爲末。新汲水調一錢服。衛生易

諸蟲咬傷。本草附方以燈火熏之。出水妙。

又方。救急易方諸惡蟲傷。以膩粉生薑汁調傅傷處。

又方。奇效良方用白礬雄黃黃蠟等分。丸如指頭大。遇有傷處。匙上溶開。滴傷

處。或以竹筒按上滴入。則毒不散。

雄黃散。千金療一切惡蟲咬著人成瘡。不可辨認。醫療不効者。

雄黃

礬砂

白礬

露蜂房各等分

右爲細末。入麝香少許。同研勻。用醋調塗瘡上。難辨認者。尤宜速療。三

五日。毒氣入心。不得聞哭聲。衛生易簡無白瘡。有乳香。瘡二十七般蟲。咬傷人及瘡腫。

凡蟲毒所傷。痛極危急。或因傷經風。而牙關緊閉。角弓反張。不省人事者。

此毒流經絡也。急用蒜切片。以艾灸之。令傷處着火。痛裂則氣聚而毒

隨氣返。返則毒提。傷處得火而散。即隨火瘡而泄。不致內攻矣。若灸十

餘壯。不應。即加至三五十壯。無不應手而愈者。故療癰毒者。以隔蒜灸

法。有回生之功也。古人有淋洗灸刺等法。正以引導經絡。祛邪解散之

意予遇施此法而應手者比比故記之。醫

誤中蛇虺百蟲毒。毒醫大全

雄黃一錢 巴豆一粒 乾薑五分 麝香一分

共研細開水調服。

諸物入耳門。附入鼻入目
眼被物撞者

療耳中有物不可出方。千金以弓弦從一頭令散傳好膠挂耳中物上停之

令相著徐徐引出。附後附方云。麻
繩剪令頭散。

百虫入耳。千金蜀椒末一撮以醋半升調灌耳中行二十步即出。又方火

熨桃葉捲之取塞耳立出。又方以葱涕灌耳中虫即出。又方若甲

虫入耳者以火照之即向明出或蜘蛛諸蟲入耳以酢灌之或麻油或

人尿亦佳。

又方。衛生易簡用鷄冠血滴入耳中即出。又方用蒼耳草搗自然汁灌少許

於耳內其蟲即傾出。

百蟲入耳不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫

自出右耳亦然。集驗良方又方宜閉口勿言以紙塞耳竅鼻竅只空虫入之

耳用藤油滴入耳竅中或出或死。集驗良方

如蟲夜間暗入者切勿驚慌喊叫逼虫內攻宜正坐點燈光向耳竅其虫

見光即出對面有人其虫不出。正宗

蜈蚣入耳。後時以木葉裹鹽多令熱以掩耳上即出。冷復易之驗。又閉氣

滿即吐之復閉準前以出爲度。或死耳中徐徐以鈎針出之。

又方。救急易方用生薑汁灌耳中自出。又方。本朝經驗用蘿蔔汁灌耳中亦佳。

蜘蛛入耳。惠聖小蒜搗研取汁灌耳中自出。又方。地龍一條納葱葉中化

水滴耳中其蜘蛛亦化爲水。

又方。環竹堂方蝸牛全搥碎置於耳邊即出。

又方。衛生易簡用龍腦少許吹入耳中其虫即化爲水。又方。用貓尿灌耳中

立出。取貓尿用盆盛貓以生薑擦牙。

飛蛾入耳。後時先大噓氣仍閉口掩鼻呼氣其蟲隨氣而出。又方。閉氣以

葦管極吸之即出亦療百蟲入耳。百代壽宗。吸虫訣云。療諸蟲入耳。藥品不便者。此法最妙。竹管入透半耳中。使口用力一

吸。其蟲隨氣而出。俗人未識此捷。

又方。衛生易簡用醬汁灌耳中又擊銅器於耳傍。

蟻入耳。後時燒陵鯉甲末以水和灌之。

療小蟲蟻入耳挑不出。衛生易簡燈心浸油釣出虫。

療百節蜘蛛并蟻入耳。本草附方苦酒注之起行即出。

水入耳中。救急易方用薄荷汁點之立効。又用麻油點耳內立出。

水銀入耳。及入六畜等耳皆死。怪症方以金銀着耳邊。水銀即吐出。

療黃豆入耳。救急方用鵝翎管截作長一二寸許。去其中膜。留少許於一頭。

以有膜之頭。入耳中。口氣吸之即出。

又方。本朝經驗若在左耳。以手緊塞右耳。及兩鼻孔。令閉氣。一人將中指緊按

豆入耳根下凹處。一手將耳朵向下引挽。患人一勢努氣。豆自出。右耳

亦然。

諸物入鼻不出。本朝經驗作紙撚刺鼻打嚏一聲即出。若不出。頻頻取嚏爲佳。

療目莽芒草沙石輩。眯不出。後肘磨好墨。以新筆點往目中。瞳子上。

又方。聖惠療雜物眯目不出。雞肝血往目中。神效。又方。白蘘荷根。搗絞汁

注目中即出。又方。書中白魚。以乳汁和研注眼中良。

又方。聖濟生栗七粒嚼爛。取汁洗之即出。

又方。本草大藕洗搗綿裹。滴汁入目中即出。

麥芒入眼不出方。外臺煮大麥汁注眼中。即出良。

眼被物撞着。聖惠杏仁爛研。以人乳汁浸頻頻點。

又方。葉氏方牛漩日兩三次點之。避風。黑睛破亦可。

又方。本朝經驗水仙花根掘取洗研爛。和沙糖點眼中。又方。麻蠅頭數十箇。

研和砂糖水。點眼中。又方。鹿茸爲細末。調人乳。頻頻滴眼中。

誤吞諸物門

誤吞鈎方肘後若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若薏子輩就貫之著

繩稍稍令推至鈎處小小引之則出

誤吞錢外擣火炭末服方寸匕則出

又方聖葵菜不以多少絞取汁冷飲之即出

又方魏氏爛嚼鳧茈嚙之多爲妙生熟皆可百一方云自然消化成水

又方華林廣記草索頭寸剪十四段燒葵菜汁調服

誤吞銅錢經方木賊草爲末每服一錢用鷄子白調下

又方怪症多食胡桃自化出也胡桃與銅錢共食成粉可證矣

又方博要以小羊蹄草嚼嚙即下

誤吞金銀或銅錢入腹衛生易簡石灰一杏仁大硫黃一皂莢子大

同研末酒調服

又方續醫韭菜熱而不斷與蠶豆同咽之不過二次從大便出

又方救急易方肥肉與葵菜作羹即食數頓則銅鐵自然下

誤吞銅錢救急易方用桑柴灰細研米飲調下二錢或用菉豆粉冷水調下三

錢或生茨菰取呷或濃煎艾湯飲或多服飴糖立出又方用艾蒿五

兩水五升煮取一升頓服之立下又方以蜜一升服之即出

療誤吞鐵石骨刺等不下危急_{百一}

王不留行

黃蘗皮_{等分}

右爲細末。蒸餅圓如彈子大。以麻線穿之。掛當風處。每用一圓。冷水化開灌下。立效。

誤吞銅錢。或金銀等物不能化。_得用砂仁。濃煎湯服之。自下。

誤吞針類。_{救急易方}用好磁石含之。卽出。或爲末服方寸匕。又以香油一盞

服之。次用乾麪燒餅令人食飽。其針隨大糞中出。

誤吞針。刺咽中痛者。_{湯醫大全}亂麻筋一團。搓龍眼大。以線穿繫留線頭在外。

以湯浸濕。急吞下咽。頃刻扯出。其針必刺於麻中而出。如一回不中節。

再吞再扯。又方。針入咽。無藥可施。癩蝦蟆數個。將頭剝去。倒垂流血。

以甌接之。得一盃許。灌入喉中。移時連針吐出。針自軟曲。

兒誤吞針。哽喉不下。死在須臾。_{保元}用黑砂糖。和黃泥爲丸。令兒吞下。泥裹

針于內。大便而下。

誤吞鈎線。_{聖惠}蟻蛭去身。吞其頭數枚。勿令本人知。

誤吞線錘。_{續醫說}啖以錫半斤。卽於穀道中。隨穢而下。凡誤吞五金者。皆可

啖也。

誤吞竹木。入喉咽出入不得者。_{本草附方}故鋸燒令赤。漬酒中。及熱飲之。又

方。秤鍾燒紅。淬酒飲之。

誤吞稻芒

本草附方

白錫頻食。又用脂麻炒研。白湯調下。

又方

直指

蓬砂牙消等分爲末。蜜和半錢含嚥。

誤吞蜈蚣

毒醫大全

急吞生鷄蛋二枚。不可嚥。次日即裹出。

又方。生公鷄熱

血。灌入喉中。蜈蚣即出。

案聖惠集載以上二方。並云更飲茶油盡許。須臾大吐。以蜈蚣畏油故也。

又方

醫法指南

韭菜連根搗水。一大碗灌之。

誤吞水蛭

本草附方

藍靛和酒絞取汁服。

又方

口齒類要

食蜜即愈。試以活蛭投蜜中。即化爲水。屢驗。一書云。井中生蛭

以白馬骨投之。即無。試之亦驗。夫蛭即螞蝗也。雖死爲末。見水復活。吞

之爲害不小。療以前法。無不愈者。

誤吞馬蝗腹痛

毒城

用田中泥爲丸。水吞下。其蟲必隨吐瀉出。

誤吞水蟲。食蜜即化。

醫法指南

誤吞田螺。下喉將死者。

奇方類編

將鴨一隻。以水灌之。少時將鴨倒懸。令吐涎。

與病人服之。即化。

誤吞小蛇。悶亂欲死。

本朝經驗

柿餅五六枚。水煎多飲之。瀉下而愈。

木屑搶喉

奇方類編

鐵斧磨水灌之。即愈。

誤吞髮。繞喉不出。

本草附方

元頭亂髮。燒作灰。水服一錢。

誤吞大骨

養竹堂方

南礪砂含化即愈

誤吞硝子碎片。噎喉不下欲死。

本朝經論

款冬花根莖燒灰爲末。白湯勻服之。

又方。山厓黃土。水攪頻頻飲之。極驗。硝子得土即消也。

吞桃枝竹杖

湯醫大全

但口中數數多食白糖。自消去。

誤吞磁鋒

傷醫大全

生紅蘿蔔搗爛吞下。其磁鋒即從大便而出。

誤食諸蟲

本草附方

蜀椒制其毒。

誤食蜘蛛暴死

本草附方

取貓涎送下解毒藥。

諸物哽噎門

附

兒頭入臼

指入竹筒

療魚骨鯁在喉中。衆法不能去。

外

取飴糖丸如鷄子黃大吞之。不去。又吞。

此用得効也。又方。以少許礪砂。口中咀嚼嚥之立下。

又方。小嚼薤

白令柔。以繩繫中央。持繩一端。吞薤到哽處。引哽當隨出。

救急易方云。以薤一小塊。以蜜煮

用。即與此法同。

又方。作竹篾刮令滑。綿纏內咽中。令至哽處。可進退引之。哽

即出。又方。好蜜一匙抄。稍稍嚥之。令下良。

又方

續醫

遠取新綿白糖二物。將綿裹糖如梅大。令患人嚥下。入喉間。留

綿一半于外。時時以手牽掣。俾喉中作痒。忽然痰涎壅出。其骨粘於綿

上矣。

又方。砂糖如鷄子大爛嚼。仰面以熱酒嚥下。骨隨酒便下。又白梅取肉

去核。以砂糖含化。須臾骨軟自下。此方甚驗。

又方一百縮砂甘草等分爲末。綿裹含之。嚥汁。當隨痰出。

咽中骨哽欲死者本單白鳳仙子。研水一大呷。以竹筒灌入咽。其物即軟。

不可經牙。或爲未吹之。

療食諸魚骨鯁久不出方本右以皂角末少許。吹鼻中。得鯁出。多秘此方。

禮云。魚去乙。謂其頭間有骨如乙字形者。鯁人不肯出也。○案此方原出聖惠。

金銀銅鐵哽本草百縮砂濃煎服或鳳仙子及根摻汁下咽

薤白

慈姑汁

鳧茈

胡桃

石灰

同硫黃少許酒服

竹木哽百病

半夏服取

鯽魚膽點

象牙爲末水服

桃李哽百病

麝香酒服

棗核哽萬全人頭垢爲丸。茶下十丸吐之。

小兒誤吞一錢。在咽中不下。以淨白表紙。令卷實如箸。以刀縱橫亂割其

端。作鬚鬆之狀。又別取一箸縛鍼鈎於其端。令不可脫。先下咽中。輕提

輕抑。一探之。覺鈎入於錢竅。然後以紙卷納之咽中。與鈎尖相抵。覺鈎

尖入紙卷之端。不礙肌肉。提之而出。備門

療諸鯁方便胡氏方云。以木炭皮爲細末。研令極細。如無炭皮。堅炭亦可。

粥飲調下二錢。日四五服。以鯁下爲度。此法人家皆有。沈存中云在漢東。乃目觀其神。有劉海士

人。隣家一兒誤吞一錢。以比較之下一物。知大烏梅。制之乃服裏一錢也。他州俗使若。恒寶此方。數載用之。未有不效者。近歲果有人嘗得此方之效不復悉載。

療竹刺筭帶類鯁在喉中。蘇竹堂方用多年舊籬笆竹截斷煎濃湯吃下立愈。

竹絲鯁。傷醫大全不拘黑白。芝麻炒熟。泡湯飲。再以乾芝麻嚼服幾口。或以芝

麻搗爛嚼食。

吞銅在喉不出。傷醫大全麩炭末。指彈入喉中。其銅當即咯出。

誤吞桃李不下。傷醫大全以少許水灌小兒頭。承其水與飲即出。

誤吞鐵釘。橫喉不下。本朝經驗馬腹中石研末。水調嚥下。少頃吐出。神驗。

食鯁噎咽。逡巡至死。本朝經驗醋灌鼻孔中。立噴出。又方。蘿菔自然汁。灌

鼻中。亦佳。又方。鐵漿少許。灌口中。又方。鷄冠血和生薑汁。灌口鼻

中。雖死立出而甦。又方。冬葵子。水煎灌。亦佳。

一小兒五歲。因戲劇。以首入搗藥臼中。不復出。舉家驚呼無計。或教之。使

執兒兩足。以新汲水急澆之。兒驚啼體縮。遂得出。說書

兒頭入臼。事林廣記兒頭入鐵臼。以噴嚏藥。着鼻中。即出。

指入竹筒。事林廣記以石灰浸水。蘸餉時。即出。

諸物入肉門

療針折入肉中。千金刮象牙爲末。水和聚。着折針上。即出。

又方。增竹堂方螻蛄腦子。增補塗上即出。

右用硫黃研細調貼。以紙花貼定。覺痒時。其針即出。

針棘竹木諸刺。在肉中不出。鼠腦搗爛。厚塗之。即出。

肘後○危證簡便方云。療醫針入病。而釘折在肉中。

針誤入肉。無眼者不動。有眼者隨氣血遊走。若走向心窩胸膈者險。

傷醫大全

急用烏鴉翎數莖。炙焦黃色。研細末。酒調服一二錢。俱可。

如聖膏

傷醫大全

療針入肉。

車脂鰲油。不拘多少。研如膏。調磁石細末。攤紙

上。如錢許。貼之。每日換二次。

竹木刺在肉中不出。

千金

頭垢塗之。即出。

又方。嚼白梅以塗之。又溫小便

漬之。

又方

劉涓子方

鹿角燒灰末。以水和塗之。立出。久者不過一夕。

蘆葦刺入肉

外臺

細嚼栗子。粗盒傷處。

療竹木刺入肉

夏月集

葶麻子。搗爛塗上。即出。

又方

傷醫大全

收晚蠶蛾。入竹管內塞之。凡遇竹木刺。截入肉內。即取蠶蛾。研

細。和津唾調塗之。即出。

又方

本期經驗

螳螂頭。研和米糊。攤紙花上貼之。並療針入肉效。

如神散

本期經驗

療針及竹木刺入肉。並一切骨哽。悉效。

松葉

鳳仙花莖葉并子

右燒存性。各等分爲末。每服五七分。溫酒送下。針及竹木刺入肉者。頃

刻出，其效如神。

療少陽魚刺。

醫方集宜

用大麥不拘多少，濃煎，薰洗傷處，即止。

案：海魚，金鑑一名少陽魚。蘇頌云：尾有大

毒。海人披刺毒者，以尾竹及海鯢皮解之。

又方。

本期經驗

焚樟腦，或樟木枝葉薰之，以解刺毒。

中藥毒門

甘豆湯。

千金

甘草解百藥毒。此實如湯沃雪，有同神妙。方稱大豆汁解百藥

毒。余每試之，大懸絕，不及甘草，又能加之，爲甘豆湯，其驗尤奇。

百一選方。加煨竹葉。

凡中相反藥毒，面青脈絕，腹脹吐血，

醫書大全。蠶退紙，即出退紙。

燒灰研一錢，冷水

調服，雖危可活。

石藥毒，用白鴨尿人參。

千金

甘草安和七十二種石，一千二百種草，解百藥

毒。

本草

雄黃毒，用防己。

本草

鐵粉毒，用磁石。

皂莢。

乳香。

本草

錫毒，用杏仁。

本草

礬石毒，用大豆汁。

本草

桔梗毒，用白粥。

本草

躑躅毒，用梔子汁。

本草

杏仁毒用藍子汁草本

金銀毒水銀服數兩即出雞屎汁煮葱白汁鴨血及屎汁並療草本

大戟毒用薑瀘汁草本

甘遂毒用黑豆汁草本

芫花毒用防己 防風 甘草 桂汁草本

藜蘆毒用雄黃 溫湯 煮葱汁草本

半夏毒用生薑及乾薑汁 南星毒同草本

蜀椒毒用葵子汁 蒜 桂汁 人尿 冷水 土漿 鷄毛燒吸烟及

調水服草本

礪砂毒用菉豆汁 浮萍草本

丹砂毒用藍青汁 鹹水草本 用鹽半兩以冷水攪勻令澄旋旋服之又

以蚌肉食之良奇效 良方

桂毒用葱汁草本

銅毒用慈姑 胡桃 鴨通汁草本

苦瓠毒用穠米汁 麥穠汁草本

瓜蒂毒用麝香草本 又方本朝經驗服瓜蒂吐不止嚼味噌汁又令患人踞床以

桶盛冷水漬脚至膝立止案傳物志以冷水漬至膝脚瓜至數十枚

解砒霜毒

本草

煩躁如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾。黑鉛四兩。磨水一

盞灌之。

又方。麻油一碗灌之。

經驗良方云。立可起死神驗。暴發知要云。緊束其腹吐之。

又方。白扁豆不拘多少。爲細末。入青黛等分。細研。再入甘草末少許。巴豆一枚。去殼。不去油。別研爲細末。取一半。入藥內。以砂糖一大塊。水化開。添成一大盞飲之。毒隨利去。後服五苓散之類。醫林集要。用益元散。又方。鹽醋多飲之。吐出毒即解。不可飲水。

又方。

危症

急以人尿汁灌之。即解。若在胸中作楚者。急以膽礬三分。研細

冷水調灌。即吐出。若在腹中痛甚者。宜用黑鉛四兩。磨水兩三碗。漸磨漸灌。即大瀉出毒氣而愈。在膈上。則瓜蒂散吐之。在腹中。則萬病解

毒丹下之。入門

救急丹

辨證錄

大下毒藥。莫此爲甚。救法必須吐其毒。

甘草

二兩

瓜蒂

七箇

玄參

二兩

地榆

五錢

水煎服。一下喉即吐。再煎渣服之。又吐。砒霜之毒必盡。

苦參湯

辨證錄

此方亦神妙。苦參三兩。煎湯一碗。一氣服之。即大吐而愈。

總以吐解毒盡爲度。醒後仍顛不語者。每日以菉豆水飲之。毒盡自愈。

藥方

瀉毒神丹

石室秘傳

服砒霜之毒。五藏欲裂者。腹必大痛。舌必伸出。眼必流血。

而死最可憐也。急用此。

當歸_{三兩} 大黃_{一兩} 白礬_{一兩} 甘草_{五錢}

水煎湯數碗飲之。立時大瀉。則生。否則死矣。

砒霜服下未久者。取鷄蛋一二十箇。打入碗內。攪勻。入明礬末三錢灌之。

吐則再灌。吐盡便愈。洗冤錄

解砒毒神驗方。秋聲錄 白礬三錢。調水飲之。立解。

黃礬散。醫心悟 服毒者。砒信爲重也。用小薊根搗汁飲之。立救。或用此散療。

據云奇效。

大黃_{一兩} 明礬_{五錢}

共爲末。每服三四錢。冷水調下。

誤中砒毒。橫身紫黑。百解不效。此名砒霜爛瘡。傷寒大全 黃土地。上挖一斗大

坑。以井水滿之。攪令渾濁。以一碗與之。少刻又與之。待渾身紫黑俱散。

一吐即甦。雖冬月間。亦宜用此法。必效。

解斑蝥毒。百一以澤蘭接汁飲之。乾者爲細末。白湯調下。

又方。青囊雜錄 玉簪根。搗水服之。即解。

又方。洗冤錄 黑小豆汁服之。差。用肥皂水灌下。再以鵝翎絞喉數次。令吐即

活。又方。用生鷄卵。開孔灌入口中。連灌五六枚。得吐即活。倘閉以箸

扶開灌入

療食野葛已死者方。後附以物開口。取鷄子三枚。和以灌之。須臾吐野葛出。

又方。取生鴨。就口斷鴨頭。以血瀝口中。入咽則活。若口不開。取大竹筒。以一頭拄其胸脅。取冷水注筒中。數易注之。須臾口開。則可與藥。若甚者。兩脅及臍。各筒注之。甚佳。又方。飲甘草汁。但唯多更善。

又方。千金煮桂汁飲之。又噉葱涕佳。葱涕療諸毒

又方。藏方急以升麻湯探吐。亦妙。又方。用犬糞汁灌下。即可解。或用葦

菜汁灌下。亦可。

通腸解毒湯。辨證療服斷腸草。氣不能通。腹痛便閉而死。

甘草兩一 大黃兩一 金銀花兩一 水煎服。一瀉。

胡蔓草。即鉤吻葉如茶。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生。廣西愚

民。私怨拊以自斃。家人覺之。急取抱卵未生鷄兒。細研。和以清油。幹口

灌之。乃盡吐出惡物而甦。少遲不可救矣。如人誤服此藥者。止以前法

解之。嶺南衛生方

烏頭天雄附子毒。用大豆汁。遠志。防風。棗肉。飴糖。本草又用人參汁。陳壁

土。泡湯菹豆汁。并華水。案朱子文集云。中烏頭毒。勢甚危惡。多飲新水。大瀉泄而解。此亦不可不知也。

又方。百多年壁土。熱湯泡。攪之。令濁。少頃乘熱去脚。取飲。不省人事。灌之。

或掘地以水攪漿水飲亦妙。

又方本草童尿飲之。又黃連湯飲之。

又方環碎錄麻痺不省者。竹青濃煮汁溫冷服之。

又方保元錄嘔吐不止。以香油灌下立解。

又方暴證知要目赤狂躁。用蘿菔汁入黃連甘草汁。各半盞服。

又方博要類纂急以冷水漱口。飲一二口尤佳。蓋野猪每中藥箭。必走入溪澗

飲水。此其驗也。一方飲少生麻油。

一人服附子酒多。頭腫大如斗。唇裂血出。急取菉豆黑豆。各數合。生嚼。併

煎濃汁飲之。通解。危證簡便

巴豆毒。用煮黃連汁。大豆汁。菖蒲汁。煮寒水石汁。冷水。本草

又方肘後下利不止。黃連乾薑等分爲末。水服方寸匕。又大豆煮汁一升飲

之。

又方危證簡便以黃連黃柏煎湯冷服。忌食熱湯熱性藥物。

又方百一生油即解。

又方怪症方芭蕉根汁解之。

又方本經論下利不止困頓。用參連湯。人參二錢。黃連一錢。

水煎。兼啜冷粥。

解輕粉毒

本草

齒縫出血臭腫。買衆黃連各半兩。煎水冰片少許。時時漱之。

又方

醫方

出山黑鉛五斤。打壺一把。盛燒酒十五斤。納土茯苓半斤。乳香

三錢。封固。重湯煮一日夜。埋土中。出火毒。每日早晚任性飲數杯。後用

瓦盆接小便。自有粉出爲驗。服至筋骨不痛乃止。

又方

暴毒

誤吞輕粉。筋骨痛。川椒半斤。湯泡曬乾。三炮三晒爲丸。天花粉

爲衣。空心溫酒下五十丸。

又方

萬全

黑鉛燒熱。淬酒數次。飲之。

又方

奇方

川椒去目。每日清晨吞之。任意不拘多少。白湯下。

中水銀毒

萬全

生炭爲末。煎汁服。

又方

本草

黑鉛解之。

又方

萬全

按開口花椒二兩吞下。即裏水銀從大便出。

解鉛粉毒

萬全

砂糖調水服。又肥皂搗爛。取汁灌下皆效。

又方以麻油

調蜂蜜與服。

皂礬毒

萬全

急取麵糊一鉢服之。

多服犀角令人煩

門入

麝香一字。調水飲之。

硫黃毒。用米醋黑鉛鐵漿朴消。

萬全

又方。黑錫煎湯服即解。

又方

聖方

硫黃毒發。令人背膊疼悶。目暗漠漠。烏梅肉焙一兩。沙糖半兩。漿

水一大盞煎七分呷之

啞芙蓉毒

保元

或不省人事用醋醋溫熱入砂糖灌下一二碗探吐之

大黃芒消毒

暴證知要

泄瀉不止用炒乾薑半兩甘草二錢烏梅二箇水煎服

陶氏殺車捷。更有粳米入參白朮附子皮升麻。右瀝心一握水煎。入炒陳壁土一匙調服。

麻黃毒

暴證知要

汗出不止將病人髮撒水盆中足露于外用炒麩皮布裹款

款烙之如再不止用撲粉

撲粉方

醫方考

龍骨

牡蠣

糯米

各等分

右爲末撲之

羊慈備置。用鉄皮糯米粉各一升龍骨牡蠣各二兩。極細末。以時絹包裹。周身撲之。

誤食臘黃

萬全續方

吃海蟄即解

案續醫說云。水母。吳人名爲海蟄。

誤服銀硃臘黃

傷醫大全

藜蘆水溫服即解

誤服銀粉

傷醫大全

麻油

黃蜜

紅砂糖

攪勻服之

又方多食生葶藶即解

又方香油灌之

又方急搗藶

煎汁飲之

桐油毒

本草

吐不止乾柿餅食之又甘草解之

又方

救急易方

熱酒飲之良

中石炭毒昏瞢

飲冷水即解

本草

服藥過劑悶亂者

外臺

水和胡粉

水和葛根

地漿

藜蘆汁

豉汁

粳米 糯米 乾薑 黃連 飴糖 飲藍汁 吞鷄子黃 刮東壁土
少少以水一二升和飲之良。燒犀角水服方寸匕。凡此諸藥飲汁
解毒者雖危急亦不可熱飲之待冷則解毒熱則不解毒也。

凡解藥毒湯劑不可熱服宜涼飲之蓋毒得熱則勢愈盛也然此特以中
熱毒爲言耳若解木鱉菌蕈黃連石膏之類而中陰毒者豈仍避熱而
猶堪以寒飲乎。傷寒
大全

集驗療中諸毒藥未死但聞腹中煩冤刺裂作聲如腸胃破斷狀目視一
人或兩人或五色光起須臾不救方外取新小便和團邊久尿一升絞
取汁一升頓服氣已絕但絞口與之入腹便活也已死萬一冀活但數
與尿汁也。

療藥毒不止煩悶千金

甘草二兩

白梁粉一升

蜜四兩

右水煎如薄粥飲一升。

楊氏家藏方。不用白梁粉。用薏
豆粉。名甘粉散。解一切藥毒。

礬灰散因三療中諸毒

白礬

牙茶各等分

右爲末每服二錢新汲水調一得吐即效未效再服。楊氏家藏方。名礬灰散。
此藥入口味甘而不覺苦。

著。是中
毒也。

青黛雄黃散因三凡始覺中毒及蛇虫咬癰疽纔作即服此令毒氣不聚。

上好青黛

雄黃等分

右爲細末。新汲水調下二錢。

化毒散

湯氏家藏

療中藥毒吐血。或心痛。或舌尖微黑。口脣裂。嚼豆不腥者是。

巴豆

一枚去心
膜研如泥

黃丹

半錢

雄黃

一字同
研細

右用烏鷄子一枚煎盤內煎成餅。摻藥在上捲爲筒子。臨睡一服。爛爛

茶清送下。當夜取下毒。

解毒藥。用露蜂房甘草等分。用麩炒令黃色。去麩爲末。水二碗煎至八分

令溫。臨臥頓服。明日取下惡物極妙。毒瘡神方

誤食毒藥。咽喉急閉。魏氏家藏用羊蹄根細研。醋調飲。吐出涎。灌蜜水。聲方出。

療中諸藥毒。衛生易簡用四物湯香蘇散各一貼。和煎服。或萱草根研汁飲之。

解一切藥毒。百一白扁豆生熟乾爲細末。新汲水調下二三錢。吳內翰備急

方云。服砒霜。大渴利。腹脹欲裂。以水調。隨所欲飲與之。即安。又方。續

隨子隨多少。以熱湯送下。毒即隨大便利去。

療吐却惡毒物後。覺胸心不安。魏氏家藏

茯苓

麥門冬

人參

各一兩

青竹茹

半兩

煮三枚。水煎服。且宜食粥。

中飲食毒門

飲食中毒煩懣。療之方。金匱

苦參

三兩

苦酒

一升

右煮三沸。三上三下服之。吐食出即差。或以水煮亦得。又方。犀角湯亦佳。

貪食食多不消。心腹堅滿痛。

金匱

鹽一升

水三升

右煮令鹽消。分三服。當吐出食便差。

蜀椒閉口者有毒。誤食之。戟人咽喉。氣便欲絕。或吐下白沫。身體痺冷。急

療之方。

金匱

濃煎豉汁飲之。桂煎汁飲之。飲冷水一二升。或食

大蒜。或飲地漿。

誤吞椒閉氣不通。百喫京棗三個。解之。

食諸菌中毒。悶亂欲死。療之方。

金匱

大豆濃煮汁飲之。人糞汁飲一升。

土漿飲一二升。服諸吐利藥並解。

食楓樹菌而笑不止。療之以前方。

金匱

誤食野芋。煩毒欲死。療之以前方。

人種芋三年不收。或野芋。並殺人。○金匱

療中蠱毒同菰毒。

金匱

左纏藤取枝莖煎汁服之。

又方。金匱取金銀花生啖。甚驗。

又方。得效用荒花生爲末。每服一錢。新汲水調服。以利爲度。

又方。朱氏某黃煎湯服。吐下解。又熟艾煮服三五盞。雄雞取熱血灌之。

又方。湯方六一散。滑石六錢。甘草一錢。研勻。每服一二錢。水調服效。

又方

藥集

生薑少許。和油食之。

村家救急方。作冬瓜。

癸丑年。家僮摘薑燒於火中。戲云。

食之味甘。一婢信之。食少許。又一婢在傍。取食些少。須臾三婢眩悶。一

倒竈中。二入房而倒。倉卒無藥。令食生薑。又喫與真油一小滴。然後目

開。渠云。眩悶中。生薑入口。則一路冷徹咽中。始知有生理。

療蕈毒欲死。一用石首魚頭。白水煮濃汁。灌之。

解菌湯

辨證錄

療誤食毒菌。胸脹心疼。腹痛。腸瀉而死。

甘草二

白芷三

水煎服。服後乃用鷄翎掃其咽喉。引其上吐。必盡吐出而愈。

又方

辨證錄

白礬五

瓜蒂七

水煎服。非吐即瀉。而愈。

食松蕈中毒

本朝經驗

喫豆腐解之。

諸蕈如饒蕈之屬。經久皆毒。人食之。並有害。茄子水煮食之。且飲煮汁解

之。

本朝經驗

野菌毒

百病主治

甘草

煎服

防風

汁

胡椒

生薑

梨葉

汁

荷葉

煎

阿魏

童尿

人尿

案吳普云。食蕈中毒。二便須通。身軟口吐。以甘草瀉煎解之。後愈。

食芋中毒

本朝經驗

地漿

生薑汁

食蟹中毒。療之方。

金匱

紫蘇煮汁飲之。搗汁飲之。亦良。

又方

本草

生藕汁

煮乾蒜汁

冬瓜汁

丁香

右服之並佳。

又方續治要訣丁香末薑湯服五分。

又方藥集成大黃 紫蘇 冬瓜

右水煎一大盞服之效。

蟹柿相反令人吐血服此解。本方 蘆根汁。

蟹柿反惡若連食時莫教吐盡血隨之。方

木香急煎湯飲之奇效。蟹柿反惡大吐瀉之以血。昏不識人。病垂殆。用木香餅子瀉之。見百一方。

食鯀鰓魚中毒。金匱蘆根煮汁服之即解。

又方一百五倍子 白礬

右等分爲細末水調灌之。又方槐花腦子右爲細末水調灌之。又

方以麻油灌之大吐毒物盡出瘡。

又方葉竹堂方用新鮮肥皂一箇如無半新者亦可去筋膜內子去黑壳搗爛

如黃豆數粒研砂少許再共搗勻切作指頂大放入口井水灌下即愈。

又方醫法指南用鷄血灌之。

又方萬全備急人尿清汁灌之吐出得生蘆根汁菉豆粉橄欖甘蔗皆不及也。

瓜蒂散辨證錄人有食河豚舌麻心悶腹脹氣難舒口開而聲不出療法宜

吐出其肉。

瓜蒂七枚

白茅根一兩

蘆根一兩

水煎汁飲之。必大吐吐後前證盡解。

食河豚毒

本朝經驗

白蠶水煎服。炙食亦可。烏賊魚墨最制其毒。

又方。無患

子。燒存性。調水服。又方。藜荷根。研取汁服之。

又方。古文錢一文。含

口中。嚥津唾。

食魚中毒。面腫煩亂方。

金匱

橘皮濃煎汁服之。即解。

鱸食之在心胸間不化。吐復不出。速下除之。療之方。

橘皮一兩

大黃

朴消各二兩

右以水一大升。煮至小升。頓服即消。

食魚中毒

萬全續方

橄欖汁。蘆根汁。吃下俱妙。

又方秘方。冬瓜搗汁飲之。

蟲魚毒

百病主治

蓬砂

同甘草。浸香油。

鱸皮

煮汁並解一切魚肉蝦蟹毒。

苦參

煎

羊蹄葉

搗汁或煎解河豚及諸魚毒。

療自死六畜肉中毒方

金匱

黃蘗屑。搗水服方寸匕。

療食生肉中毒方

金匱

掘地深三尺。取其下土三升。以水五升。煮數沸。澄清

汁。飲一升即愈。

此即地漿。

療食六畜肉中毒方

千金

燒赤小豆一升。爲末。服三方寸匕。神良。

療食鰱肉漏脯中毒方

鰱肉。各諸毒之。漏者。是也。○金匱

燒犬屎酒服方寸匕。每

服人乳汁亦良。

犬屎。肘後作人尿。

飲生韭汁三升亦得。

化漏湯

辨證錄

療食漏脯致胸膈飽滿上吐下瀉大腸如刀割疼痛。

山查三錢

甘草五錢

大黃三錢

厚朴三錢

白芷二錢

麥芽二錢

水煎服。

療六畜鳥獸肝中毒方

金匱

水浸豆豉絞取汁服數升愈。

療食馬肉中毒欲死方

金匱

香豉二兩

杏仁三兩

蒸一食頃熟杵之服日

再服。又方煮蘆根汁飲之良。

療食牛肉中毒方

金匱

甘草煮汁飲之即解。

療食野菜馬肝肉諸脯肉毒

金匱

取頭垢如棗核大吞之起死人。又狗屎

燒灰水和絞取汁飲之立愈。

療諸食中毒方

金匱

飲黃龍湯及犀角汁無不療也。飲馬尿亦良。又服韭汁

數升。

黃龍湯

本草

即糞清。大明日臘月截淡竹去青皮浸漚取汁療天行熱疾中

毒。

療以雉肉作餅臠因食皆吐下方

金匱

犀角爲末服方寸匕。

食雉子毒

事林廣記

飲醋少許即消。

又方

本草

飲薑汁。

療食鴨肉成病胸滿面赤不下食

聖惠

糯米泔溫服一中盞。

療食白鱸鷄子過多致病藥錄蘇一升。煮服一云。蒜一升煮服之。其全備愈云。取蒜

子一升煮食之。吐而愈。

療中鳩毒氣欲死者聖用葛根三合。水三升。中盞調飲之。如口噤者。以物揭

開灌之。

食鷄中毒吐不止萬全續方生犀角末。新汲水調下。即愈。

諸鳥肉毒事林廣記生白扁豆末。冷水服之。

食鱸魚中毒欲死聖生薑根。舂取汁多飲。乃良。并療蟹毒。亦可煮蘆葦茸

汁飲之。

食章魚中毒本朝經驗鹿角菜。湯浸化飲之。亦解諸魚毒。又方。熱灰投滾湯

中。澄清服之。

食鱉魚中毒本朝經驗炒豆腐湯攪飲之。又方。鐵漿飲之。又方。大黃爲末

五六分。白湯送下。又方。櫻葉水煎服。嚼櫻子亦佳。椎樹葉乾者。水

煎服。又方。眼子菜水煎服。大效。

解食毒龜秘方集驗飲藍汁數碗。如無。藍汁乾。青水亦可。

駒溺湯辨證錄療食龜而腹痛欲死。馬尿一兩甘草一兩

水煎服。得吐即愈。不吐即再飲。二煎無不愈者。

中驚毒孫醫大全

白芷

雄黃各三錢

丹砂

山查

枳實各一錢

茯苓五錢

水煎服。一劑痛止。二劑毒出矣。

又方本胡椒解之。

馬刀毒本飲新汲水解之。

食肉傷萬全備急

山查三十個。搥碎。濃煎湯飲。

又方。阿魏煎湯飲。

療飲酒連日醉不醒後

蕪菁菜並少米熟煮。去滓冷之。內鷄子三枚。或七

枚。調勻飲之。二三升。

又方。搗生葛根汁。及葛藤餅。和絞汁飲之。無濕

者。乾葛煎服佳。乾蒲煎服之。亦佳。

飲酒中毒經日不醒者。今人謂之中酒也。用黑豆一升。煮取汁。溫服一小

盞。不過三服即愈。醫說

飲酒過多不解

萬全備急

鷄距子煎汁啜之。

酒肉過度腹脹。以食鹽擦牙漱下。如湯沃雪。

萬全備急

燒酒醉死本急以新汲水。浸其髮。外以故帛浸濕。貼其胸膈。仍細細灌之。

至甦乃已。

又方

藥方集驗

冷汚泥。搭胸前。燥即再搭。直至泥濕爲度自愈。凡酒毒至死。黑

大豆二升煎汁飲愈。

又方

醫法指南

飲好醋二杯。即醒。

又方將頭髮浸入新汲水內。用熱豆腐切片。遍身貼之。冷即更換。再煎

葛根湯飲之。醒後宜食菜豆湯。

又方

東醫寶鑑

過飲燒酒中毒。則面青口噤。昏迷不省。甚則腐腸穿膈。遍身青

黑冷。吐下血。死在須臾。初覺便脫衣。推身滾轉之無數。吐之即甦。又以溫湯。裸體浸灌。常令溫暖。若灌冷水即死。又取生瓜及蔓青。搗取汁。幹開口灌之。不住。又碎冰頻納口中。及肛門。又葛根搗取汁。灌口中。漸醒而愈。

燒酒以錫壺盛。經宿飲之。令人醉悶不省。以陳壁土攪水澄清。入甘草湯

灌之。即醒。危症簡便

飲酒中毒

本朝經驗

眼子菜水煎服之。

飲點刺酒中毒

西岸造者是。○本朝經驗

食鹽水煮飲三四碗。乃瘥。

食熱麵中毒

本朝附方

蘿蔔搗取汁飲之。無生者。則取子。水研取汁飲之。又地

骨皮煮取汁飲之。又赤小豆末和水服。即愈。

又方

萬全續方

暖酒和薑汁服。

食糲傷

萬全續方

以水和壁上黃土一錢。即瘥。

食蕎麥中毒

本朝經驗

楊梅皮爲末。白湯送下。

又方。多服蘿蔔汁亦可。又杏

仁生啖即消。

又方。荻花莖葉。

即隨軍茶

剉水煎服。

又方。柑皮搗絞汁服。

乾者水煎服。又方海帶水煎服。

豆粉毒百病 杏仁 豆腐 蘿蔔

療豆腐毒朱氏 蘿蔔煎湯飲之。

又方門入杏仁水研取汁飲之。

又方東醫過食豆腐腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安。若飲酒即死。

解鹽鹵毒災方 豆腐漿灌下。如無生漿將黃豆浸濕搗爛灌下。抹桌布水。

或肥皂水皆能令吐切不可用熱。

又方辨證鹽鹵之毒必至口鹹作渴腹中疼痛身踉腳縮而死療法必用

甘以解之用甘草三兩煎湯救之如服已久加當歸二兩腸潤未必皆

死也。

多喫茶中毒本朝 砂糖 甘草 白梅 鹽醋 並解其毒。

食竹筍中毒本草 生薑及麻油能殺其毒。

又方本朝腹緊滿手不可近蕎麥殼水煎多飲之。又海帶煮汁服之亦可。

喫油煤諸物中毒本朝 柑皮水煮飲之。

水芹毒百病 硬糖 杏仁同乳研梗

食銀杏中毒百病 香油多飲吐之。又地漿藍汁甘草汁飲之。

又方方便銀杏樹根煎濃湯灌下即活。

又方

公選良方

小兒食之過多，胞脹欲死，急用白鯊頭煎湯，頻頻灌之，少頃自

定。

秘方集驗云：白鯊多食之，成瘋，療法同上。○傷風大全云：凡中白菓毒，腹中一聚即覺去，便如驚狀者是，療法亦同。

中白菓毒

錄信

將木香滾水磨汁，入麝香少許，服之即解，或將白果殼搗

爛煎服。

食桃成病

外臺

桃梟燒灰二錢，水服，取吐即愈。

食梨過傷

事林廣記

梨葉煎汁解之。

食柑毒

事林廣記

柑皮湯解，鹽湯亦可。

食菱傷作脹

萬全備急

生薑汁飲之，立消。又麝香少許，水煎服。

食瓜過多

本草

但飲酒及水，服麝香。

又方

萬全錄方

食白鯊魚，即化為水，或加麝香少許。

又食瓜菓傷，心腹堅脹，

痛悶不安，用鹽二兩，水一碗，煎消燉服，吐下即安。

食西瓜中毒

本朝經驗

番椒剉浸水飲之。

食胡椒中毒

本朝經驗

菉豆粉解之，噎而欲絕者，香油灌之。

療食諸菜中毒方

千金

甘草

貝齒

胡粉

各等分

右爲細末，水服方寸匕。

又小兒尿乳汁，共服二升，亦好。

又方

外臺

取雞毛燒末，以飲服方寸匕，差。

療食諸菜中毒，發狂煩悶，吐下欲死。

聖惠

雞糞燒灰爲末，水服一錢，未解更

服。

又方

本草

甘草

香油

並佳。

中藹毒

說

生薑汁。或濃薑湯服。

食雜菰菓子過多。腹脹氣急。

東醫寶鑑

桂心爲末。飯丸菰豆大。以水吞下十丸。

未愈再服。又桂皮濃煎。取汁飲之。又服瓜蒂散吐之。卽愈。

又方入門桂心末五錢。麝香一錢。飯丸菰豆大。白湯下十五丸。卽效。名曰桂

香丸。

喫菓腹痛

事林廣記

高良薑末。熱湯調服。立見效。

凡海中菜。多食損人。令腹痛發氣。吐白沫。飲熱醋卽安。凡海菜傷皆同此

法。

東醫寶鑑

飲冰水。及涼水過多。心脾疼痛。

萬全錄方

用川椒二十粒。浸于漿水中一宿。還

以水吞之。其病卽愈。永不發。

解烟毒

秘方集驗

砂糖調水服。

烟毒發熱。欬嗽大作。服之而痊。

醫意

麥冬

知母

山梔

花粉

黃芩

蘇子

甘草

菰仁

枇杷葉

煎成去滓。入砂糖一兩和服。

食諸肉中毒。或吐下血。胡荽子一升。煮令發裂。取汁。停冷。每服半升。又生
韭汁飲之。本草附方

療食諸毒肉。吐血不止。痿黃甚者。用葱子一升。洗煮使破。取汁停冷。服半
升。日夜各一服。血定止。衛生易簡

消肉化毒丹

辨錄

人有食牛犬之肉。一時心痛。欲吐不能。欲瀉不可。宜用

吐法。亦有探吐之不應者。療法宜消化解毒。

神麴

雷丸

山查

大黃

各三錢

厚朴

枳實

各一錢

右水煎服。此方乃逐下之神方。倘可上湧。不必用此方。

黃龍湯

奇效良方

療因食中毒。

右將竈底當釜直下掘赤土。爲細末。以冷水

調。隨多少服之。或以犀角水磨取汁飲。亦療食六畜肉中毒。大效。

飲食毒物

醫方

礪砂四兩。真香油一斤。瓶內浸之。遇有毒者。服油一小盞。

久浸尤佳。

又方。雄黃。青黛。等分。爲末。每服二錢。新汲水下。

神仙解毒萬病丸

百一

解一切藥毒。惡草。菰子。菌。蠶。金石毒。喫自死馬肉。河

豚發毒。時行疫氣。山嵐瘴癘。急喉閉。纏喉風。衝冒寒暑。熱毒上攻。或自

縊死。落水打折傷死。但心頭微暖。未隔宿者。並宜用生薑蜜水。磨一粒

灌之。須臾復甦。癰疽發背未破。魚臍瘡。諸般惡瘡腫毒。湯火所傷。百蟲

犬鼠蛇傷。并東流水磨塗。并服一粒。良久覺瘳立消。打撲損傷折。炒松節酒磨下半粒。朝鮮李宗律。紫金丹方云。如無松節酒。以炒松節。入酒燉用。乃以東流水磨塗。男子急中。及顛邪喝叫亂走。女人鬼氣鬼胎。並宜煖酒磨下。一丸可分兩服。有毒即吐。或利。毒盡自止。李宗律云。遇利一兩行無妨。只用溫粥止住。大抵下泄藥。例多上吐。如欲吐則吐。溫粥一二匙壓下。則不吐。孕婦不可服。

文蛤

三兩。淡紅黃色者。雄雉洗淨。本草云。五倍子一名文蛤。

紅芽

大戟

一兩半。淨洗。

山茨菰

二兩洗。即鬼離藥。

金燈花根也。○瓊仙活人心云。人皆不識以老鴉蒜為之。其山茨菰者。俗名金燈籠。其葉似莖。花似燈籠。其色白。上有黑點。結子三稜。二月長苗。三月開花。四月結子。空地得之。其莖枝上有毛包裹。人不可誤採時。可於有苗時。記其地。至秋冬取之。此藥中其山茨菰不真。則藥不效。李宗律曰。本草云。葉如車前。根如慈姑。則與余所得根如小蒜。葉如莖者病。乃知瓊仙所云者。與余同。而亦為本草所謂零陵薑茨菰無疑矣。但其花上黑點。或有或無。亦豈風土之異矣。○案葉氏錄驗。楊氏家藏並云。山茨菰。乃是玉簪花根白花者。今致本草無其說。尤可疑。錄以待識者辨之。

續隨子

一兩。去殼淨。研細。裏壓出油再研如白霜。

麝香

二錢研。

右將前三味。焙乾為細末。入麝香續隨子。研令勻。以糯米粥為丸。每料分作四十粒。於端午七夕重陽日合。如欲急用。辰日亦可。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝子不具足。雞犬之類見之。李宗律云。今案合末重七兩。七兩五錢。每劑可用糯米二合。淘淨作糜飯。重六兩六錢合糊。重十四兩。杵後重十四兩三四錢。蓋湯時或粘着。乾燥則添水故也。陳自明瓊仙王應荷。皆以一劑分為四十粒。余恐人不度氣之強弱老幼。每服一粒也。今分為八十粒。王應荷所謂每服半粒。亦此意也。

續隨子

半兩

麝香

一錢

大戟

七錢

全蝎

五枚

山荳根

半兩

朱砂

各二錢

雄黃

各二錢

主療修製同上

太乙神丹

一名送毒丹。乾地生。

文蛤

三兩

山茨菰

二兩

大戟

半兩

千金子一兩

麝香三錢

雄黃一兩

朱砂五錢

右主療修製同上

外科正宗。太乙紫金丹即是。

寒解毒萬病圖。始見葉氏綠驗方。名聖授奪命丹。又觀音散。而楊氏家藏方加板藍根。名解毒圖。然其主療修製之詳。至百一方而備焉。後世或名玉樞丹。或名紫金錠。皆此方耳。而諸家增味頗多。特危氏萬病解毒圖。羅仙大乙神丹。諸家多採用。故附于此。

跋

醫有讀汗牛之書而不能施理者焉。又有好施理術而不識一丁字者焉。故世人恆嘲言。讀書者不善理。善理者不讀書。其爲弊也久矣。殊不知讀書而不善理者。剽精剽神於無用之學也。施理而不讀書者。師心逞臆於司命之職也。均是吾道蠹賊。其不罹天網者。僥倖而已矣。吾先人創建醫學。意在矯此二弊焉。伯兄廉夫繼先志。上自乾元崇文之秘帙。石包天承之奧冊。下至山經地志。稗乘勝說。苟涉係吾道者。莫不搜索而採擷也。今日所處劑者。即昨日所抄牘。善讀而善理者。唯吾伯兄有焉。如此然後可能解世人之嘲矣。頃伯兄著救急選方。此亦抄牘之所得也。其書援據該博。在讀者自知之。蓋先人選濟急方。有意補續。未果而逝。故伯兄繼其志云。此書之行。不特在救疾疢之危急。而在革醫家之宿弊焉。伯兄之志。能達寰宇。則醫家負書簾之謗者。與錯用錫錫之人。均當愧沮而悔改焉。其功於吾道。豈淺淺乎哉。癸亥正月初九日。胞弟湯川倓安道跋。

家君以濟衆爲己任。每慨今世醫家。或平素不研其術。一旦遇卒暴之證。錯愕失措。遂致天橫。乃病在尋也。著此書。以備應急之資。其啟來學。惠亦溥矣。享和初付之開雕。未幾燬于火。今茲再命翻梓。廣刷行之。醫

家預讀此書。精窮其術。使世人無復斃乎委靡手。則家君濟衆之功。亦與天壤不朽云。

文化庚午孟冬既望不肖男元胤奕祺謹題